平成30年度

処分場自然共生調査（海生生物生育状況調査）

報告書

平成30年9月

株式会社エヌ・イー サポート 大阪支店

目 次

1 調査概要	1
1-1 調査名称-----	1
1-2 目的-----	1
1-3 調査場所-----	1
1-4 調査内容-----	1
1-5 履行期間-----	1
1-6 請負者-----	1
2 調査方法	4
2-1 事前周知・手続き等-----	4
2-2 坪刈りによる付着動植物調査-----	4
2-3 目視による付着動植物調査-----	7
2-4 遊泳魚類等調査-----	8
2-5 水質調査-----	9
2-6 藻場分布調査-----	10
3 調査結果	14
3-1 調査実施日-----	14
3-2 坪刈りによる付着動植物調査-----	15
3-2-1 植物（海藻）-----	15
(1) 神戸沖埋立処分場-----	15
(2) 大阪沖埋立処分場-----	16
(3) 泉大津沖埋立処分場-----	17
3-2-2 動物（付着動物）-----	19
(1) 神戸沖埋立処分場-----	19
(2) 大阪沖埋立処分場-----	19
(3) 泉大津沖埋立処分場-----	19
3-3 目視による付着動植物調査-----	26
3-3-1 植物（海藻）-----	26
(1) 神戸沖埋立処分場-----	26
(2) 大阪沖埋立処分場-----	29
(3) 泉大津沖埋立処分場-----	32
3-3-2 動物（付着動物）-----	36
(1) 神戸沖埋立処分場-----	36
(2) 大阪沖埋立処分場-----	39
(3) 泉大津沖埋立処分場-----	42
3-3-3 ブロック側面、裏面の状況（付着動植物）-----	48
(1) 神戸沖埋立処分場-----	48
(2) 大阪沖埋立処分場-----	52
(3) 泉大津沖埋立処分場-----	56

3-4 遊泳魚類等調査	58
(1) 神戸沖埋立処分場	58
(2) 大阪沖埋立処分場	60
(3) 泉大津沖埋立処分場	62
3-5 水質調査	66
(1) 神戸沖埋立処分場	66
(2) 大阪沖埋立処分場	71
(3) 泉大津沖埋立処分場	76
3-6 藻場分布調査	81
3-6-1 代表地点における目視観察結果	81
(1) 神戸沖埋立処分場	81
(2) 大阪沖埋立処分場	82
3-6-2 代表地点における定量採取結果	84
(1) 神戸沖埋立処分場	84
(2) 大阪沖埋立処分場	86
3-6-3 藻場分布状況	88
(1) 神戸沖埋立処分場	88
(2) 大阪沖埋立処分場	131
4 結果のまとめ	172
4-1 付着動植物の状況	172
(1) 神戸沖埋立処分場	172
(2) 大阪沖埋立処分場	180
(3) 泉大津沖埋立処分場	187
4-2 遊泳魚類等の状況	197
(1) 神戸沖埋立処分場	197
(2) 大阪沖埋立処分場	197
(3) 泉大津沖埋立処分場	198
4-3 水質等の状況	199
(1) 神戸沖埋立処分場	199
(2) 大阪沖埋立処分場	200
(3) 泉大津沖埋立処分場	201
4-4 藻場分布の状況	202
(1) 神戸沖埋立処分場	202
(2) 大阪沖埋立処分場	204
4-5 まとめ(要約)	206
(1) 神戸沖埋立処分場	206
(2) 大阪沖埋立処分場	207
(3) 泉大津沖埋立処分場	208

- ・ 資料編
- ・ 写真集

1 調査概要

1-1 調査名称

自然共生調査（海生生物生育状況調査）

1-2 目的

本調査は、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場および泉大津沖埋立処分場護岸における海生生物の分布状況を把握するとともに、緩傾斜護岸が有する「海生生物の生息環境の保全・創造効果」を確認することを目的として実施した。

1-3 調査場所

神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場および泉大津沖埋立処分場の護岸（図 1-1）

1-4 調査内容

調査内容を表 1-1 に示す。

表 1-1 調査内容

名称	項目	単位	数量	摘要
計画・準備	計画準備	式	1	
調査実施	坪刈りによる付着動植物調査	地点	4	神戸、大阪 各 1 地点、泉大津 2 地点 1 回
	目視による付着動植物調査	地点	10	神戸、大阪 各 3 地点、泉大津 4 地点 1 回
	遊泳魚類等調査	地点	10	神戸、大阪 各 3 地点、泉大津 4 地点 1 回
	水質調査	地点	9	神戸、大阪、泉大津 各 3 地点 1 回
	藻場分布調査	km	7.5	神戸 3.8km、大阪 3.7km 1 回
解析評価	調査結果等の解析評価	式	1	
	報告書の作成	式	1	

1-5 履行期間

自：平成 30 年 4 月 19 日 ～ 至：平成 30 年 9 月 30 日

1-6 請負者

株式会社エヌ・イー サポート 大阪支店

図 1-1 (1) 調査位置図 (神戸沖埋立処分場)

図 1-1 (2) 調査位置図 (大阪沖埋立処分場)

図 1-1 (3) 調査位置図 (泉大津沖埋立処分場)

2 調査方法

2-1 事前周知・手続き等

関係機関に対して、調査実施に係る内容説明の周知を行った。また同時に、海上保安部（阪神港長宛）に対する港内作業許可申請、兵庫県および大阪府に対して特別採捕許可の申請を行った。

2-2 坪刈りによる付着動植物調査

図 2-2 に示した、神戸沖埋立処分場 1 点（A-2）、大阪沖埋立処分場 1 点（C-2）、泉大津沖埋立処分場：2 点（D-2、D-3）の計 4 点において、坪刈りによる動植物の定量採取を行った。

各調査地点で鉛直方向の上層（平均海面±0m）、中層（平均海面-2m）、下層（平均海面-4m）の 3 層で、50cm×50cm の方形枠を設置し、水中カメラを用いて撮影後、採取した。現地で 1mm 目のフルイでふるい分けを行った後、試料容器に分取し持ち帰り、植物については種の同定、種類別湿重量の測定、動物については種の同定、種類別個体数の計測、種類別湿重量の測定を行った。

表 2-1 坪刈りによる付着動植物調査 調査方法等

調査方法等		調査地点
植物（種の同定・種類別湿重量）	坪刈り水深（各点、3層） 上層：平均海面±0m	神戸沖埋立処分場：1点 （A-2）
動物（種の同定・種類別個体数・湿重量）	中層：平均海面-2m 下層：平均海面-4m	大阪沖埋立処分場：1点 （C-2） 泉大津沖埋立処分場：2点 （D-2、D-3）

図 2-1 坪刈り、目視等潜水調査 実施状況模式図

図 2-2(1) 現地調査地点等位置図（神戸沖埋立処分場）

図 2-2(2) 現地調査地点等位置図（大阪沖埋立処分場）

図 2-2(3) 現地調査地点等位置図 (泉大津沖埋立処分場)

2-3 目視による付着動植物調査

図 2-2 に示した、神戸沖埋立処分場 3 点 (A-2、A-4、A-5)、大阪沖埋立処分場 3 点 (C-1、C-2、C-3)、泉大津沖埋立処分場 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6) の計 10 点において、目視観察による動植物の観察を行った。

各調査地点で平均水面+1m から 1m 間隔で海底面まで、水深 1m 毎に 50×50cm の方形枠を設置し、枠内の植物（種類別被度）、動物（種類別被度または個体数）の観察を行った。泉大津沖埋立処分場の 2 地点 (D-5、D-6) については、エコ岸壁が設置されていたため、遊水室内の上面、側面、下面に分けて全体面の観察を実施した。また、観察箇所については写真撮影による記録を行った。

表 2-2 目視観察による付着動植物調査 調査方法等

調査方法等		調査地点
目視観察 植物（種類別被度） 動物（種類別被度または個体数）	観察水深帯（各点、1 測線） 平均水面+1m から 1m 間隔で海底面までを対象	神戸沖埋立処分場：3 点 （A-2、A-4、A-5） 大阪沖埋立処分場：3 点 （C-1、C-2、C-3） 泉大津沖埋立処分場：4 点 （D-2、D-3、D-5、D-6）

2-4 遊泳魚類等調査

図 2-2 に示した、神戸沖埋立処分場 3 点 (A-2、A-4、A-5)、大阪沖埋立処分場 3 点 (C-1、C-2、C-3)、泉大津沖埋立処分場 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6) の計 10 点において、目視観察による遊泳魚類、イカ・タコ類の観察を行った。

各調査地点の護岸周辺に生息している魚類、イカ・タコ類を対象として、潜水目視観察を行い、種類別個体数の記録を行った。なお、個体数は CR 法 (表 2-4) によって概略的に把握した。

表 2-3 遊泳魚類等調査 調査方法等

調査方法等		調査地点
潜水目視観察による種類別個体数 (CR 法※による) の記録	護岸周辺に生息する魚類	神戸沖埋立処分場 : 3 点 (A-2、A-4、A-5) 大阪沖埋立処分場 : 3 点 (C-1、C-2、C-3) 泉大津沖埋立処分場 : 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6)

※ : CR 法 目視観察により確認できた生物の量を段階的に cc (非常に多い) ~rr (非常に少ない) の表記で示す目視観察調査結果の記録方法。

表 2-4 CR 法による個体数区分

記号	個体数区分
rr	1~2 個体
r	3~10 個体
c	11~50 個体
cc	51 個体以上

2-5 水質調査

図 2-2 に示した、神戸沖埋立処分場 3 点 (A-2、A-4、A-5)、大阪沖埋立処分場 3 点 (C-1、C-2、C-3)、泉大津沖埋立処分場 3 点 (D-2、D-5、D-6) の計 9 点において、多項目水質計による水質調査を行った。

調査船を GPS 測位により所定の位置に誘導した後、調査船上より透明度板を垂下して透明度を計測した。その後、多項目水質計を用いて水温、塩分、DO、光量子束密度の鉛直測定（海面～海底まで 1m 間隔、海面下 0.5m、海底面上 1m）を行った。

また、調査時の一般気象・海象、水色の記録を行った。

水質調査の調査項目及び方法を表 2-5 に示した。

表 2-5 水質調査 調査方法等

調査項目	調査方法等		調査地点
水温・塩分・DO	多項目水質計による鉛直測定	海面～海底まで 1m 間隔、海面下 0.5m 及び海底面 +1.0m 透明度は船上から観測	神戸沖埋立処分場：3 点 (A-2、A-4、A-5) 大阪沖埋立処分場：3 点 (C-1、C-2、C-3) 泉大津沖埋立処分場：3 点 (D-2、D-5、D-6)
光量子束密度			
透明度			

表 2-6 水質調査 使用機器

項目	使用機器
水温・塩分 溶存酸素 (DO) 光量子束密度	多項目水質計 AAQ176 (JFE アドバンテック社製)

2-6 藻場分布調査

図 2-3 に示した、神戸沖埋立処分場では陸揚げ栈橋の範囲と北護岸を除く護岸(3.8km)、大阪沖埋立処分場では東護岸を除く護岸(3.7km)を調査対象として、藻場分布調査を実施した。

調査範囲の護岸に沿って、水中スクーター等を使用して移動しながら藻場の分布状況、構成種の目視観察を行った。

図 2-3、表 2-8 に示した各調査対象護岸で代表的な地点(各 6 地点)で、地点付近の藻場構成種の目視観察と水中写真撮影を行うとともに、方形枠(50 cm×50 cm)内の植物を採取し、持ち帰って種類別湿重量の測定を行った。

藻場分布の分析項目及び分析内容を表 2-7 に示す。

これらの結果と付着動植物調査の結果から、護岸延長を 50m 毎、平均海面から法尻までを 1m 間隔で区切ったメッシュ状の藻場分布図を作成した。

表 2-7 藻場分布調査 調査方法等

調査方法等	分析内容等	調査地点(範囲)
藻場構成種の目視観察を各処分場 6 点(測線)で実施。測線間については、水中スクーターを使用して藻場分布範囲の目視確認を行った。坪刈り調査は、各処分場あたり、6 地点で実施した。	種の同定 種類別湿重量 の測定	神戸沖埋立処分場： 周囲 3.8km 大阪沖埋立処分場： 周囲 3.7km

図 2-3 (1) 藻場分布調査 目視観察 代表地点位置図 神戸沖埋立処分場

図 2-3 (2) 藻場分布調査 目視観察 代表地点位置図 大阪沖埋立処分場

表 2-8 (1) 藻場分布調査 目視観察代表地点等位置 緯度経度 【神戸沖埋立処分場】

地点	緯度	経度	備考
A-1	N 34° 39' 53.7"	E 135° 16' 51.7"	藻場分布調査 代表地点
A-2	N 34° 39' 31.9"	E 135° 16' 55.9"	水質、付着動植物等調査地点
A-3	N 34° 39' 10.3"	E 135° 16' 59.9"	藻場分布調査 代表地点
A-4	N 34° 39' 03.4"	E 135° 16' 47.9"	水質、付着動植物等調査地点
A-5	N 34° 39' 28.6"	E 135° 16' 31.1"	水質、付着動植物等調査地点
A-7	N 34° 39' 58.2"	E 135° 16' 39.1"	本年度調査対象外
K-1	N 34° 39' 02.9"	E 135° 16' 58.0"	本年度調査対象外
K-2	N 34° 39' 03.4"	E 135° 16' 36.2"	藻場分布調査 代表地点
K-3	N 34° 39' 04.8"	E 135° 16' 34.9"	本年度調査対象外
K-4	N 34° 39' 09.4"	E 135° 16' 33.4"	藻場分布調査 代表地点
K-5	N 34° 39' 53.5"	E 135° 16' 26.3"	藻場分布調査 代表地点
K-6	N 34° 39' 59.2"	E 135° 16' 50.2"	本年度調査対象外
K-7	N 34° 39' 58.0"	E 135° 16' 52.1"	本年度調査対象外
K-8	N 34° 39' 31.6"	E 135° 16' 55.4"	藻場分布調査 代表地点
K-a	N 34° 39' 54.8"	E 135° 16' 26.9"	本年度調査対象外
K-b	N 34° 39' 58.2"	E 135° 16' 28.9"	本年度調査対象外
K-c	N 34° 39' 05.5"	E 135° 17' 00.4"	本年度調査対象外

表 2-8 (2) 藻場分布調査 目視観察代表地点等位置 緯度経度 【大阪沖埋立処分場】

地点	緯度	経度	備考
C-1	N 34° 37' 05.7"	E 135° 20' 50.3"	水質、付着動植物等調査地点
C-2	N 34° 37' 07.3"	E 135° 20' 38.8"	水質、付着動植物等調査地点
C-3	N 34° 37' 32.6"	E 135° 20' 46.6"	水質、付着動植物等調査地点
C-4	N 34° 37' 47.0"	E 135° 20' 59.0"	藻場分布調査 代表地点
C-5	N 34° 37' 29.2"	E 135° 21' 20.1"	本年度調査対象外
C-6	N 34° 37' 48.8"	E 135° 21' 21.5"	本年度調査対象外
O-1	N 34° 37' 35.6"	E 135° 21' 28.7"	藻場分布調査 代表地点
O-2	N 34° 37' 18.2"	E 135° 21' 05.8"	本年度調査対象外
O-3	N 34° 37' 11.9"	E 135° 20' 59.3"	藻場分布調査 代表地点
O-4	N 34° 37' 10.9"	E 135° 20' 57.1"	本年度調査対象外
O-5	N 34° 37' 01.9"	E 135° 20' 45.2"	本年度調査対象外
O-6	N 34° 37' 02.9"	E 135° 20' 42.4"	藻場分布調査 代表地点
O-7	N 34° 37' 19.0"	E 135° 20' 34.8"	藻場分布調査 代表地点
O-9	N 34° 37' 56.6"	E 135° 21' 09.7"	本年度調査対象外
O-13	N 34° 37' 25.8"	E 135° 20' 39.4"	藻場分布調査 代表地点
O-14	N 34° 37' 56.5"	E 135° 21' 12.6"	本年度調査対象外
O-16	N 34° 37' 40.2"	E 135° 21' 30.6"	本年度調査対象外

3 調査結果

3-1 調査実施日

各現地調査は、関係機関との調整、港内作業および特別採捕の許可を受け（表 3-2）、表 3-1 に示す平成 30 年 6 月 2 日（神戸沖埋立処分場）、平成 30 年 6 月 3 日（大阪沖埋立処分場）および平成 28 年 5 月 26 日（泉大津沖埋立処分場）に実施した。

表 3-1 現地調査実施日

調査箇所	調査実施日
神戸沖埋立処分場	平成 30 年 6 月 2 日（土）
大阪沖埋立処分場	平成 30 年 6 月 3 日（日）
泉大津沖埋立処分場	平成 30 年 5 月 26 日（土）

表 3-2 現地調査に関する港内作業および特別採捕許可

種別	調査箇所	海域	許可者	許可日	許可番号等
港内作業許可	大阪沖	阪神港大阪区	阪神港長	平成 30 年 5 月 21 日	大第 288 号
	神戸沖	阪神港神戸区	阪神港長	平成 30 年 4 月 25 日	神第 204 号
	泉大津沖	阪神港堺泉北区	阪神港長	平成 30 年 5 月 9 日	堺第 133 号
特別採捕許可	大阪沖	大阪市地先	大阪府知事	平成 30 年 5 月 18 日	水第 1053-19 号 特第 30-19 号
	泉大津沖	泉大津市地先			
	神戸沖	神戸市地先	兵庫県知事	平成 30 年 5 月 9 日	30 加特第 4 号

3-2 坪刈りによる付着動植物調査

3-2-1 植物（海藻）

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-3 に神戸沖埋立処分場（A-2）における坪刈り調査の結果を示した。上層（平均海面±0m）、中層（平均海面-2m）、下層（平均海面-4m）の3層で50×50cmの枠内に生育する海藻類を採取し、同定および湿重量の計測を行った。図 3-1 には調査箇所（海藻類採取前）の状況を示した。

神戸沖では、7~14種の海藻が出現し、中層、下層の種類数が多かった。湿重量では16.44~142.41 (g/0.25 m²) の海藻が採取され、アオサ属の繁茂する上層で最も多くなっていた。

種別では上層ではアオサ属、中層ではシダモク、下層ではムカデノリが最も多く確認され、藻場を形成する大型褐藻として、中層でシダモク、タマハハキモクがみられた。

表 3-3 坪刈り調査結果 神戸沖埋立処分場（A-2 海藻）

No.	門	綱	目	科	種名 / 項目	調査地点 神戸沖			
						持番号	A-2-上	A-2-中	A-2-下
						湿重量	湿重量	湿重量	
1	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Enteromorpha sp.	アサノ属	0.71		
2	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Ulva sp.	アサノ属	134.49	+	+
3	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Chaetomorpha sp.	シウスノ属			
4	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Cladophora sp.	シオグサノ属	7.21	+	0.09
5	緑色植物	緑藻	シム	シム	Codium fragile	シム			
6	黄色植物	褐藻	カモノリ	カモノリ	Colpomenia sinuosa	カモノリ			0.05
7	黄色植物	褐藻	コブ	コブ	Undaria pinnatifida	ウカメ			
8	黄色植物	褐藻	ヒバマ	ヒバマ	Sargassum filicinum	シダモク		54.88	
9	黄色植物	褐藻	ヒバマ	ヒバマ	Sargassum muticum	タマハハキモク		0.55	
10	紅色植物	紅藻	ウケノリ	ウケノリ	Pyropia suborbiculata	マカハアマリ	+		
11	紅色植物	紅藻	テングサ	テングサ	Gelidionopsis freshwateri	ヒメテングサ	+		
12	紅色植物	紅藻	テングサ	テングサ	Gelidium elegans	マサ		0.02	+
13	紅色植物	紅藻	スズノリ	イソカ	Caulacanthus ustulatus	イソカノリ	+		
14	紅色植物	紅藻	スズノリ	スズノリ	Halarachnion latissimum	スズノリ			
15	紅色植物	紅藻	スズノリ	スズノリ	Chondrus giganteus	オホノリ			
16	紅色植物	紅藻	スズノリ	スズノリ	Chondrus ocellatus	シノリ			
17	紅色植物	紅藻	スズノリ	スズノリ	Chondrus sp.	シノリノ属			0.42
18	紅色植物	紅藻	スズノリ	ムカデノリ	Grateloupia asiatica	ムカデノリ		0.82	15.68
19	紅色植物	紅藻	スズノリ	ムカデノリ	Grateloupia lanceolata	ムカデノリ		1.93	
20	紅色植物	紅藻	スズノリ	ムカデノリ	Grateloupia turuturu	ムカデノリ		0.04	
21	紅色植物	紅藻	スズノリ	ムカデノリ	Grateloupia sp.	ムカデノリノ属			
22	紅色植物	紅藻	スズノリ	イソノリ	Hypnea sp.	イソノリ		0.02	
23	紅色植物	紅藻	スズノリ	イソノリ	Pyssoniellaceae	イソノリ科			
24	紅色植物	紅藻	スズノリ	ベニソコ	Schizymenia dubyi	ベニソコ			
25	紅色植物	紅藻	オノノリ	オノノリ	Gracilaria textorii	オノノリ		0.22	
26	紅色植物	紅藻	マゴノリ	マゴノリ	Champia parvula	マゴノリ			
27	紅色植物	紅藻	マゴノリ	マゴノリ	Chrysmenia wrightii	マゴノリ			
28	紅色植物	紅藻	マゴノリ	マゴノリ	Rhodymenia intricata	マゴノリ			
29	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Antithamion sp.	イソノリノ属		+	0.02
30	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Ceramium sp.	イソノリノ属		+	
31	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Pterothamion sp.	イソノリノ属			0.14
32	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Ceramiales	イソノリ科			+
33	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Polysiphonia senticulosa	イソノリノ属			
34	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Polysiphonia sp.	イソノリノ属		+	0.04
35	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Symphocladia linearis	イソノリノ属			
36	藍色植物	藍藻	—	—	Cyanophyceae	藍藻綱	+	+	
種類数							7	14	10
湿重量(g)合計							142.41	58.48	16.44

注1: 単位は湿重量(g)/0.25m²を示す。
注2: *は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

図 3-1 坪刈り調査箇所（坪刈り前）の状況

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-4 に大阪沖埋立処分場 (C-2) における坪刈り調査の結果を示した。上層 (平均海面±0m)、中層 (平均海面-2m)、下層 (平均海面-4m) の3層で50×50cmの枠内に生育する海藻類を採取し、同定および湿重量の計測を行った。図 3-2 には調査箇所の状況 (海藻類採取前) を示した。

大阪沖では、10~19 種の海藻が確認され、中層、下層の種類数が多かった。湿重量では90.94~1,210.95 (g/0.25 m²) の海藻が採取され、ワカメの繁茂する中層で最も多くなっていた。

種別では上層ではフダラク、中層、下層ではワカメが最も多く、藻場を形成する大型褐藻として、上層から下層までワカメが、中層でタマハハキモクがみられた。

表 3-4 坪刈り調査結果 大阪沖埋立処分場 (C-2)

No.	門	綱	目	科	種名	項目	大阪沖		
							C-2-上 湿重量	C-2-中 湿重量	C-2-下 湿重量
1	緑色植物	緑藻	ワサ	ワサ	Enteromorpha sp.	ワサ属	+		
2	緑色植物	緑藻	ワサ	ワサ	Ulva sp.	ワサ属	0.34	+	
3	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Chaetomorpha sp.	シユズモ属			+
4	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Cladophora sp.	シオグサ属	+		+
5	緑色植物	緑藻	ミル	ミル	Codium fragile	ミル			
6	黄色植物	褐藻	カモリ	カモリ	Colpomenia sinuosa	アコロリ			+
7	黄色植物	褐藻	コンブ	チグイ	Undaria pinnatifida	ウナ	0.62	917.86	60.91
8	黄色植物	褐藻	ヒノマ	ホングラ	Sargassum filicinum	シグモク			
9	黄色植物	褐藻	ヒノマ	ホングラ	Sargassum muticum	タマハキモク		10.39	
10	紅色植物	紅藻	ウケリ	ウケリ	Pyropia suborbiculata	ウケリ	+		
11	紅色植物	紅藻	フングサ	フングサ	Gelidiophycus freshwateri	ヒメフングサ			
12	紅色植物	紅藻	フングサ	フングサ	Gelidium elegans	ワカメ			0.14
13	紅色植物	紅藻	イソカ	イソカ	Caulacanthus ustulatus	イソカ			
14	紅色植物	紅藻	スサガベニ	スサガベニ	Halarachnion latissimum	スサガベニ			
15	紅色植物	紅藻	スギノ	スギノ	Chondrus giganteus	オハツノマ		0.13	
16	紅色植物	紅藻	スギノ	スギノ	Chondrus ocellatus	ツノマ		1.64	
17	紅色植物	紅藻	スギノ	スギノ	Chondrus sp.	ツノマ属	2.60	+	1.47
18	紅色植物	紅藻	ムカデノ	ムカデノ	Grateloupia asiatica	ムカデノ		1.53	
19	紅色植物	紅藻	ムカデノ	ムカデノ	Grateloupia lanceolata	ムカデノ	104.90	234.83	23.72
20	紅色植物	紅藻	ムカデノ	ムカデノ	Grateloupia turuturu	ムカデノ	33.68	0.37	
21	紅色植物	紅藻	ムカデノ	ムカデノ	Grateloupia sp.	ムカデノ属			
22	紅色植物	紅藻	イノ	イノ	Hypnea sp.	イノ属			
23	紅色植物	紅藻	イノ	イノ	Peyssonniaceae	イノ科		*	*
24	紅色植物	紅藻	ベニ	ベニ	Schizymenia dubyi	ベニ		17.51	0.35
25	紅色植物	紅藻	オコ	オコ	Gracilaria textorii	オコ	16.75	26.49	3.23
26	紅色植物	紅藻	マゴシバリ	マゴシバリ	Champia parvula	マゴシバリ		0.02	
27	紅色植物	紅藻	マゴシバリ	マゴシバリ	Chrysmenia wrightii	マゴシバリ			
28	紅色植物	紅藻	マゴシバリ	マゴシバリ	Rhodymenia intricata	マゴシバリ			
29	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Antithamion sp.	イソ科		0.13	+
30	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Ceramium sp.	イソ科		+	0.01
31	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Pterothamion sp.	イソ科	+	0.02	1.11
32	紅色植物	紅藻	イソ	イソ	Ceramiceae	イソ科		+	+
33	紅色植物	紅藻	ワカメ	ワカメ	Polysiphonia senticulosa	ワカメ			
34	紅色植物	紅藻	ワカメ	ワカメ	Polysiphonia sp.	ワカメ		0.03	+
35	紅色植物	紅藻	ワカメ	ワカメ	Symphocladia linearis	ワカメ		+	
36	藍色植物	藍藻	-	-	Cyanophyceae	藍藻綱			
種類数							10	19	15
湿重量 (g) 合計							158.89	1210.95	90.94

注1: 単位は湿重量 (g)/0.25m²を示す。
注2: *は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

図 3-2 坪刈り調査箇所 (坪刈り前) の状況

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-5 に泉大津沖埋立処分場の 2 点 (D-2、D-3) における坪刈り調査の結果を示した。上層 (平均海面±0m)、中層 (平均海面-2m)、下層 (平均海面-4m) の 3 層で 50×50cm の枠内に生育する海藻類を採取し、同定および湿重量の計測を行った。図 3-3 には調査箇所 (海藻類採取前) の状況を示した。

・地点 D-2

D-2 の地点では、10~15 種の海藻が確認され、上層、下層で種類数が多かった。湿重量では 72.16~856.91 (g/0.25 m²) の海藻が採取され、ワカメが繁茂していた中層で最も多くなっていた。

種別では上層ではフダラク、中層ではワカメ、下層ではタオヤギソウが最も多く、藻場を形成する大型褐藻としてはワカメが中層および下層で繁茂していた。

表 3-5 (1) 坪刈り調査結果 泉大津沖埋立処分場 (D-2)

No.	門	綱	目	科	種名	項目	泉大津沖		
							D-2-上	D-2-中	D-2-下
1	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Enteromorpha sp.	アサノ属	0.01	+	+
2	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Ulva sp.	アサノ属	0.10	+	
3	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Chaetomorpha sp.	アサノ属			
4	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Cladophora sp.	アサノ属	+	0.21	+
5	緑色植物	緑藻	ミル	ミル	Codium fragile	ミル			
6	黄色植物	褐藻	カモノリ	カモノリ	Colpomenia sinuosa	カモノリ			
7	黄色植物	褐藻	ウツクサ	ウツクサ	Undaria pinnatifida	ウツクサ		810.00	159.67
8	黄色植物	褐藻	ホンダマ	ホンダマ	Sargassum filicinum	ホンダマ			
9	黄色植物	褐藻	ホンダマ	ホンダマ	Sargassum muticum	ホンダマ			
10	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Pyropia suborbiculata	ウツクサ			
11	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Gelidiophycus freshwateri	ウツクサ			
12	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Gelidium elegans	ウツクサ	0.05		
13	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Caulacanthus ustulatus	ウツクサ			
14	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Halarachnion latissimum	ウツクサ			
15	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Chondrus giganteus	ウツクサ			
16	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Chondrus ocellatus	ウツクサ			
17	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Chondrus sp.	ウツクサ			
18	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Grateloupia asiatica	ウツクサ		7.98	10.01
19	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Grateloupia lanceolata	ウツクサ	64.95	2.32	9.27
20	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Grateloupia turuturu	ウツクサ	2.23	2.49	21.50
21	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Grateloupia sp.	ウツクサ			4.24
22	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Hypnea sp.	ウツクサ			+
23	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Pyssonnellaceae	ウツクサ			
24	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Schizymenia dubyi	ウツクサ			2.23
25	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Gracilaria textorii	ウツクサ	3.23	30.77	60.27
26	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Champia parvula	ウツクサ	0.10		
27	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Chrysmenia wrightii	ウツクサ			221.04
28	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Rhodymenia intricata	ウツクサ	1.35		
29	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Antithamion sp.	ウツクサ			
30	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Ceramium sp.	ウツクサ	+	+	+
31	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Pterothamion sp.	ウツクサ	+		+
32	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Ceramiales	ウツクサ	+		
33	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Polysiphonia senticulosa	ウツクサ	0.12		
34	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Polysiphonia sp.	ウツクサ	0.02	3.14	0.04
35	紅色植物	紅藻	ウツクサ	ウツクサ	Symphocladia linearis	ウツクサ			
36	藍色植物	藍藻	—	—	Cyanophyceae	藍藻綱	+		
種類数							15	10	14
湿重量 (g) 合計							72.16	856.91	488.27

注1: 単位は湿重量 (g)/0.25m² を示す。
注2: +は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

上層 中層 下層

図 3-3 (1) 坪刈り調査箇所 (坪刈り前) の状況

・地点 D-3

D-3 の地点では、4～9 種の海藻が確認され、中層で最も種類数が多くなっていた。湿重量では 0.45～122.66 (g/0.25 m²) の海藻が採取され、ワカメが繁茂していた中層で最も多くなっていた。

種別では上層ではミル、中層ではワカメ、下層ではタオヤギソウが多く、藻場を形成する大型褐藻として、中層、下層でワカメがみられた。

表 3-5 (2) 坪刈り調査結果 泉大津沖埋立処分場 (D-3)

No.	門	綱	目	科	種名	項目	調査地点		
							泉大津沖	D-3-上	D-3-中
						検番号	湿重量	湿重量	湿重量
1	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Enteromorpha sp.	アサノ属	+		
2	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Ulva sp.	アサノ属		+	
3	緑色植物	緑藻	シオクサ	シオクサ	Chaetomorpha sp.	シユクモ属			
4	緑色植物	緑藻	シオクサ	シオクサ	Cladophora sp.	シオクサ属	0.08	0.12	
5	緑色植物	緑藻	シル	シル	Codium fragile	シル	0.37	1.77	
6	黄色植物	褐藻	カサノリ	カサノリ	Colpomenia sinuosa	カサノリ			
7	黄色植物	褐藻	ユヅ	ユヅ	Undaria pinnatifida	ユヅ		119.82	11.73
8	黄色植物	褐藻	ヒノマ	ヒノマ	Sargassum filicinum	ヒノマ			
9	黄色植物	褐藻	ヒノマ	ヒノマ	Sargassum muticum	ヒノマ			
10	紅色植物	紅藻	ウツノリ	ウツノリ	Pyropia suborbiculata	ウツノリ			
11	紅色植物	紅藻	テングサ	テングサ	Gelidiophycus freshwateri	ヒナテングサ			
12	紅色植物	紅藻	テングサ	テングサ	Gelidium elegans	テングサ			0.12
13	紅色植物	紅藻	スギノリ	イノモク	Caulacanthus ustulatus	イノモク			
14	紅色植物	紅藻	スギノリ	スガカヘニ	Halarachnion latissimum	スガカヘニ			7.16
15	紅色植物	紅藻	スギノリ	スギノリ	Chondrus giganteus	オホノリ		0.94	
16	紅色植物	紅藻	スギノリ	スギノリ	Chondrus ocellatus	ウツノリ			
17	紅色植物	紅藻	スギノリ	スギノリ	Chondrus sp.	ウツノリ属			
18	紅色植物	紅藻	スギノリ	ムツノリ	Grateloupia esigeica	ムツノリ			
19	紅色植物	紅藻	スギノリ	ムツノリ	Grateloupia lanceolata	ムツノリ			
20	紅色植物	紅藻	スギノリ	ムツノリ	Grateloupia turuturu	ムツノリ			
21	紅色植物	紅藻	スギノリ	ムツノリ	Grateloupia sp.	ムツノリ属			
22	紅色植物	紅藻	スギノリ	ヒノノリ	Hypnea sp.	ヒノノリ属		+	
23	紅色植物	紅藻	スギノリ	ウツノリ	Peyssoneliaceae	ウツノリ科			
24	紅色植物	紅藻	スギノリ	ヘニノリ	Schizymenia dubyi	ヘニノリ			
25	紅色植物	紅藻	スギノリ	スギノリ	Gracilaria textorii	スギノリ			
26	紅色植物	紅藻	マコノリ	マコノリ	Champia parvula	マコノリ			
27	紅色植物	紅藻	マコノリ	マコノリ	Chrysmenia wrightii	マコノリ			70.60
28	紅色植物	紅藻	マコノリ	マコノリ	Rhodymenia intricata	マコノリ			
29	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Antithamnion sp.	イノモク属			
30	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Ceramium sp.	イノモク属		+	
31	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Pterothamnion sp.	イノモク属			
32	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Ceramiales	イノモク科		+	+
33	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Polysiphonia senticulosa	イノモク属			
34	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Polysiphonia sp.	イノモク属		0.01	
35	紅色植物	紅藻	イノモク	イノモク	Symphocladia linearis	イノモク			
36	藍色植物	藍藻	—	—	Cyanophyceae	藍藻綱	+		
種類数							4	9	5
湿重量 (g) 合計							0.45	122.66	89.61

注1: 単位は湿重量 (g)/0.25m²を示す。
注2: +は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

図 3-3 (2) 坪刈り調査箇所 (坪刈り前) の状況

3-2-2 動物（付着動物）

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-6 に神戸沖埋立処分場（A-2）における坪刈り調査分析結果（付着動物）を示した。

上層（平均海面±0m）、中層（平均海面-2m）、下層（平均海面-4m）の3層で50×50cmの枠内に生育する付着動物を採取し分析した結果、25～61種の付着動物が出現し、個体数では309～22,706（個体/0.25㎡）、湿重量では35.68～608.77（g/0.25㎡）の付着動物が採取され、個体数、湿重量ともにムラサキイガイが多数出現した上層で最も多くなっていた。

種別（個体数）では上層ではムラサキイガイ、中層ではマルエラワレカラ、下層ではCirratulus属（ミズヒキゴカイ科）が最も多く確認された。

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-7 に大阪沖埋立処分場（C-2）における坪刈り調査分析結果（付着動物）を示した。

上層（平均海面±0m）、中層（平均海面-2m）、下層（平均海面-4m）の3層で50×50cmの枠内に生育する付着動物を採取し分析した結果、46～71種の付着動物が出現し、個体数では9,489～90,351（個体/0.25㎡）、湿重量では171.06～9,252.90（g/0.25㎡）の付着動物が採取され、個体数、湿重量ともにムラサキイガイが多数出現した上層で最も多くなっていた。

種別（個体数）では上層ではムラサキイガイ、中層ではキヌマトイガイ、下層ではクマノアシツキが最も多く確認された。

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-8 に泉大津沖埋立処分場の2点（D-2、D-3）における坪刈り調査分析結果（付着動物）を示した。

上層（平均海面±0m）、中層（平均海面-2m）、下層（平均海面-4m）の3層で50×50cmの枠内に生育する付着動物を採取し、分析した。

D-2の地点では、29～69種の付着動物が出現し、個体数は334～3,833（個体/0.25㎡）、湿重量では27.46～119.74（g/0.25㎡）の範囲にあった。個体数ではキヌマトイガイが多く出現した中層が、湿重量ではエゾカサネカンザシゴカイ、コシダカガンガラが多く出現したやはり中層が最も多くなっていた。

D-3の地点では、43～50種の付着動物が出現し、個体数は1,312～23,213（個体/0.25㎡）、湿重量では67.69～400.08（g/0.25㎡）の範囲にあった。個体数ではクマノアシツキが多く出現した中層が、湿重量ではエゾカサネカンザシゴカイが多く出現したやはり中層が最も多くなっていた。

表 3-6 (1) 坪刈り調査結果 神戸沖埋立処分場 (A-2 付着動物)

No.	門	綱	目	科	種名	調査地点 採番号	神戸沖					
							A-2-上		A-2-中		A-2-下	
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	海綿動物	尋常海綿	-	-	DEMOSPONGIAE	尋常海綿綱			*	1.35	*	8.61
2	刺胞動物	ヒトコ	ウツク	ウツク科	Campanulariidae	ウツク科						
3	刺胞動物	花虫	イソノチク	イソノチク目	Actiniaria	イソノチク目	6	0.27	4	0.11		
4	刺胞動物	花虫	イソノチク	イソノチク科	Rhizangiidae	イソノチク科						
5	扁形動物	渦虫	多岐腸	-	Polycladida	多岐腸目						
6	扁形動物	-	-	-	NEMERTINEA	紐形動物門	103	0.95	27	0.17	2	0.02
7	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Acanthopleura japonica	ウツク科						
8	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Chitonidae	ウツク科						
9	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Mopalia retifera	ウツク科					1	0.19
10	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Acanthochitona achates	ウツク科			5	0.78		
11	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Acanthochitona defilippii	ウツク科						
12	軟体動物	多板	新ビラガイ	ウツク科	Acanthochitona sp.	ウツク科						
13	軟体動物	腹足	ウツク	ウツク科	Cellana toreuma	ウツク科						
14	軟体動物	腹足	ウツク	ウツク科	Lottia tenuisculpta	ウツク科						
15	軟体動物	腹足	ウツク	ウツク科	Patelloida saccharina	ウツク科						
16	軟体動物	腹足	古腹足	ウツク科	Omphalius rusticus	ウツク科						
17	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Littorina brevicula	ウツク科	6	0.01				
18	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Peasiella habei	ウツク科	29	+				
19	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Alvania sp.	ウツク科						
20	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Stosicia annulata	ウツク科						
21	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Rissoidea	ウツク科			46	0.01		
22	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Crepidula onyx	ウツク科					4	2.77
23	軟体動物	腹足	盤足	ウツク科	Serpulorbis imbricatus	ウツク科					1	0.41
24	軟体動物	腹足	翼舌	ウツク科	Gyroscaia lamellosa	ウツク科						
25	軟体動物	腹足	翼舌	ウツク科	Epitoniidae	ウツク科						
26	軟体動物	腹足	翼舌	ウツク科	Stictotulima lentiginosa	ウツク科						
27	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Bedevea birileffi	ウツク科						
28	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Thais bronni	ウツク科						
29	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Thais clavigera	ウツク科						
30	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Muricidae	ウツク科						
31	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Mitrella bicincta	ウツク科					4	0.01
32	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Mitrella burchardi	ウツク科						
33	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Zafra mitriformis	ウツク科						
34	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Zafra pumila	ウツク科						
35	軟体動物	腹足	新腹足	ウツク科	Columbellidae	ウツク科			74	0.03	4	0.01
36	軟体動物	腹足	異旋	ウツク科	Architectonicidae	ウツク科						
37	軟体動物	腹足	異旋	ウツク科	Parthenina affectuosa	ウツク科						
38	軟体動物	腹足	異旋	ウツク科	Pyramidellidae	ウツク科	1	+	5	+	3	0.01
39	軟体動物	腹足	頭體	ウツク科	Smaragdinella sieboldi	ウツク科						
40	軟体動物	腹足	側體	ウツク科	Pleurobranchaea japonica	ウツク科						
41	軟体動物	腹足	側體	ウツク科	Pleurobranchaeidae	ウツク科						
42	軟体動物	腹足	側體	ウツク科	Pleurobranchidae	ウツク科						
43	軟体動物	腹足	基眼	ウツク科	Siphonaria japonica	ウツク科	5	2.05				
44	軟体動物	腹足	基眼	ウツク科	Siphonaria sirius	ウツク科						
45	軟体動物	腹足	基眼	ウツク科	Siphonariidae	ウツク科						
46	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Modiolus nipponicus	ウツク科	10	0.18	6	0.04		
47	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Musculista senhousia	ウツク科	1,235	13.41				
48	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Musculus cupreus	ウツク科			3	0.01		
49	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Mytilus galloprovincialis	ウツク科	14,973	456.19	9	0.05		
50	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Xenostrobus atratus	ウツク科						
51	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Mytilidae	ウツク科						
52	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Crassostrea gigas	ウツク科						
53	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Saccostrea kegaki	ウツク科						
54	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Ostreidae	ウツク科						
55	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Claudiconcha japonica	ウツク科						
56	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Petricola mirabilis	ウツク科						
57	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Petricola sp. cf. lithophaga	ウツク科						
58	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Petricola sp.	ウツク科						
59	軟体動物	二枚貝	ウツク	ウツク科	Hiatella orientalis	ウツク科			283	2.30	10	0.13
60	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Halosydna brevisetosa	ウツク科						
61	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Harmothoe praeclara	ウツク科					1	0.03
62	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Lepidonotus elongatus	ウツク科			8	0.21		
63	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Polynoidae	ウツク科			6	+	5	0.08
64	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Eulalia sp.	ウツク科			7	0.08	3	+
65	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Phyllodoceidae	ウツク科			7	0.25	2	+
66	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Chrysopetalidae	ウツク科						
67	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Podarkeopsis brevipalpa	ウツク科						
68	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Hesionidae	ウツク科			4	+		
69	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Autolytus sp.	ウツク科					2	+
70	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Sphaerosyllis sp.	ウツク科						
71	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Syllis amica	ウツク科						
72	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Trypanosyllis taeniaformis	ウツク科						
73	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis aciculata orientalis	ウツク科			38	0.22		
74	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis adamanteus kurilensis	ウツク科	655	7.48	15	0.13	12	0.09
75	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis alternata	ウツク科						
76	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis fasciata	ウツク科			86	0.49	1	0.01
77	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis nipponica	ウツク科					6	0.04
78	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Typosyllis sp.	ウツク科			43	1.07	18	0.31
79	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Syllinae	ウツク科			31	0.19	3	0.07
80	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Ceratonereis mirabilis	ウツク科			6	0.04		
81	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Neanthes caudata	ウツク科					2	0.04
82	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Nectoneanthes latipoda	ウツク科						
83	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Nereis heterocirrata	ウツク科	3	0.27				
84	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Nereis multigatha	ウツク科			8	0.11		
85	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Nereis neoneanthes	ウツク科			4	0.02		
86	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Perinereis cultrifera	ウツク科			3	0.19		
87	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Perinereis cultrifera floridana	ウツク科	126	16.70				
88	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Platynereis bicanaliculata	ウツク科			4	0.09		
89	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Eunice kobeensis	ウツク科					2	+
90	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Arabella iricolor	ウツク科						
91	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Schistomeringos rudolphi	ウツク科					3	+
92	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Polydora sp.	ウツク科			34	0.27	3	0.01
93	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Cirratulus sp.	ウツク科			33	2.60	122	7.85
94	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Cirriiformia sp.	ウツク科			3	0.02	5	0.04
95	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Cirratulidae	ウツク科					33	1.26
96	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Acrocirrus validus	ウツク科			900	2.78	21	0.10
97	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Polyopthalmus pictus	ウツク科			10	0.18		
98	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Loimia sp.	ウツク科			4	0.09		
99	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Thelepus sp.	ウツク科			34	1.34		
100	環形動物	多毛	ウツク	ウツク科	Terebellidae	ウツク科					3	0.11

表 3-6 (2) 坪刈り調査結果 神戸沖埋立処分場 (A-2 付着動物)

No.	門	綱	目	科	種名 /	調査地点		神戸沖				
						検番号	A-2-上		A-2-中		A-2-下	
							項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数
101	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Sabellidae			1	+			
102	環形動物	多毛	ケリムシ	カンザシコカイ	Hydroides ezoensis			79	3.78	6	0.46	
103	環形動物	多毛	ケリムシ	カンザシコカイ	Pomatoleios kraussii							
104	環形動物	多毛	ケリムシ	カンザシコカイ	Spirobranchus giganteus			3	0.25	2	0.06	
105	環形動物	多毛	ケリムシ	カンザシコカイ	Spirorbella sp.							
106	環形動物	多毛	ケリムシ	カンザシコカイ	Serpulidae			3	0.06			
107	節足動物	ウツメ	-	ウツメ綱	PCYNOGONIDA			2	0.01			
108	節足動物	顎脚	無柄	ウツメ科	Ohthamalus challengeri	4.155	108.62					
109	節足動物	顎脚	無柄	ウツメ科	Amphibalanus improvisus	26	1.84	4	0.07			
110	節足動物	顎脚	無柄	ウツメ科	Balanus trigonus			3	0.22			
111	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Ampithoe sp.	27	0.05	184	0.70			
112	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Grandidierella sp.	5	+					
113	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Aoroides sp.	4	+	9	0.03			
114	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Monocorophium sp.			104	0.14			
115	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Erichthonius pugnax							
116	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Jassa sp.	22	0.04	12	0.02			
117	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Elasmopus sp.							
118	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Melita sp.							
119	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Melitidae							
120	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Gitanopsis sp.							
121	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Stenothoe sp.							
122	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Hyalie sp.	25	0.04					
123	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Caprella equilibra							
124	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Caprella penantis	81	0.20	2,332	6.52			
125	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Caprella scaura	8	0.03	83	0.18			
126	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Caprella simia					1	+	
127	節足動物	軟甲	端脚	ウツメ科	Caprella sp.	7	+	383	0.10			
128	節足動物	軟甲	等脚	ウツメ科	Janiridae			5	0.02			
129	節足動物	軟甲	等脚	ウツメ科	Dynoides dentisinus							
130	節足動物	軟甲	等脚	ウツメ科	Paracerceis japonica	53	0.16					
131	節足動物	軟甲	ウツメ	ウツメ科	Apseudidae							
132	節足動物	軟甲	ウツメ	ウツメ科	Zeuxo sp.			10	0.02	6	+	
133	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Hippolytidae							
134	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Porcellanidae							
135	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Pagurus sp.			6	0.05	2	0.01	
136	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Cancer sp.			10	0.05			
137	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Sphaerozium nitidus							
138	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Pugettia quadridentis							
139	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Pugettia sp.			229	0.97			
140	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Pilumnus minutus							
141	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Pilumnus sp.							
142	節足動物	軟甲	十脚	ウツメ科	Megalopa of Brachyura			3	+			
143	節足動物	昆虫	ハエ	ウツメ科	Tipulidae	25	0.01					
144	節足動物	昆虫	ハエ	ウツメ科	Chironomidae	1,116	0.27	2	+			
145	触手動物	苔虫	ウツメ	ウツメ科	Phoronis sp.			11	0.20			
146	触手動物	苔虫	管口	ウツメ科	Tubuliporidae							
147	触手動物	苔虫	櫛口	ウツメ科	Vesiculariidae							
148	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Calloporidae							
149	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Bugulidae					*	0.02	
150	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Scrupocellariidae							
151	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Watersipora subovoidea			*	0.09	*	0.74	
152	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Schizoporellidae							
153	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Microporellidae							
154	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Reteporidae							
155	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Cryptosulidae							
156	触手動物	苔虫	唇口	ウツメ科	Celleporinidae							
157	棘皮動物	ヒトデ	ヒトデ	ヒトデ科	Asterina pectinifera					3	1.85	
158	棘皮動物	ヒトデ	ヒトデ	ヒトデ科	Asterias amurensis			2	3.35	1	5.62	
159	棘皮動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Ophiactidae			3	0.02	2	0.01	
160	棘皮動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Temnopleurus toreumaticus							
161	棘皮動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Phylloporidae							
162	棘皮動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Sclerodactylidae							
163	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Didemniidae							
164	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Asciidiidae					3	1.02	
165	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Perophoridae							
166	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Pyuridae							
167	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Styela clava					2	1.60	
168	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	Styeliidae			11	2.66	5	2.09	
169	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	ASCIDIACEA (colony)			*	0.05			
170	脊索動物	ウツメ	ウツメ	ウツメ科	ASCIDIACEA			4	1.01			
種類数							25		61		41	
個体数・湿重量(g)合計							22,706	608.77	5,248	35.79	309	35.68

注1: 単位は個体数・湿重量(g)/0.25m²を示す。

注2: *は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

表 3-7 (1) 坪刈り調査結果 大阪沖埋立処分場 (C-2 付着動物)

No.	門	綱	目	科	種名	調査地点		大阪沖					
						種番号	C-2-上		C-2-中		C-2-下		
							個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	
1	海綿動物	尋常海綿	-	-	DEMOSPONGIAE	尋常海綿綱	*	0.02	*	1.22	*	9.64	
2	刺胞動物	ヒドロ虫	ウツクガ	ウツクガ科	Campanulariidae	ウツクガ科							
3	刺胞動物	花虫	イボシヤク	イボシヤク目	Actiniaria	イボシヤク目					1	+	
4	刺胞動物	花虫	イボシヤク目	イボシヤク科	Rhizangiidae	イボシヤク科							
5	扁形動物	渦虫	多岐腸	-	Polycladida	多岐腸目			5	0.11			
6	扁形動物	-	-	-	NEMERTINEA	紐形動物門					15	0.23	
7	軟体動物	多板	新シラガイ	ウツクガ科	Acanthopleura japonica	ウツクガ科	53	1.80	53	1.67			
8	軟体動物	多板	新シラガイ	ウツクガ科	Chitonidae	ウツクガ科	4	74.97					
9	軟体動物	多板	新シラガイ	ヒゲシラガイ	Mopalia retifera	ヒゲシラガイ							
10	軟体動物	多板	新シラガイ	ウツクガ科	Acanthochitona achates	ウツクガ科			11	1.41			
11	軟体動物	多板	新シラガイ	ウツクガ科	Acanthochitona defilippii	ウツクガ科							
12	軟体動物	多板	新シラガイ	ウツクガ科	Acanthochitona sp.	ウツクガ科			5	0.24			
13	軟体動物	腹足	ウツクガイ	ウツクガイ科	Cellana toreuma	ウツクガイ科	22	22.16					
14	軟体動物	腹足	ウツクガイ	ウツクガイ科	Lottia tenuisculpta	ウツクガイ科							
15	軟体動物	腹足	ウツクガイ	ウツクガイ科	Patelloida saccharina	ウツクガイ科							
16	軟体動物	腹足	古腹足	ニシキウスガイ	Omphalius rusticus	ウツクガイ科							
17	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Littorina brevicula	ウツクガイ科							
18	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Peasiella habei	ウツクガイ科							
19	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Alvania sp.	ウツクガイ科			4	0.01			
20	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Stosicia annulata	ウツクガイ科							
21	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Rissoidea	ウツクガイ科							
22	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Crepidula onyx	ウツクガイ科							
23	軟体動物	腹足	盤足	ウツクガイ	Serpulorbis imbricatus	ウツクガイ科							
24	軟体動物	腹足	翼舌	ウツクガイ	Gyroscaia lamellosa	ウツクガイ科							
25	軟体動物	腹足	翼舌	ウツクガイ	Epitoniidae	ウツクガイ科							
26	軟体動物	腹足	翼舌	ウツクガイ	Stictotulima lentiginosa	ウツクガイ科							
27	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Bedevea birileffi	ウツクガイ科							
28	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Thais bronni	ウツクガイ科			15	20.22			
29	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Thais clavigera	ウツクガイ科							
30	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Muricidae	ウツクガイ科							
31	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Mitrella bicincta	ウツクガイ科			91	5.96	9	0.47	
32	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Mitrella burchardi	ウツクガイ科							
33	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Zafra mitriformis	ウツクガイ科							
34	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Zafra pumila	ウツクガイ科							
35	軟体動物	腹足	新腹足	ウツクガイ	Columbellidae	ウツクガイ科			46	0.10	413	0.40	
36	軟体動物	腹足	異旋	ウツクガイ	Architectonicidae	ウツクガイ科							
37	軟体動物	腹足	異旋	ウツクガイ	Parthenina affectuosa	ウツクガイ科							
38	軟体動物	腹足	異旋	ウツクガイ	Pyramidellidae	ウツクガイ科					14	0.08	
39	軟体動物	腹足	頭鰓	ウツクガイ	Smaragdina sieboldi	ウツクガイ科							
40	軟体動物	腹足	側鰓	ウツクガイ	Pleurobranchaea japonica	ウツクガイ科							
41	軟体動物	腹足	側鰓	ウツクガイ	Pleurobranchaeidae	ウツクガイ科			7	1.81			
42	軟体動物	腹足	側鰓	ウツクガイ	Pleurobranchidae	ウツクガイ科							
43	軟体動物	腹足	基眼	ウツクガイ	Siphonaria japonica	ウツクガイ科							
44	軟体動物	腹足	基眼	ウツクガイ	Siphonaria sirius	ウツクガイ科							
45	軟体動物	腹足	基眼	ウツクガイ	Siphonariidae	ウツクガイ科	12	8.27					
46	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Modiolus nipponicus	ウツクガイ科	23	0.83	18	1.81	11	1.44	
47	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Musculista senhousia	ウツクガイ科	1	+			2	+	
48	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Musculus cupreus	ウツクガイ科			58	2.14	220	8.99	
49	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Mytilus galloprovincialis	ウツクガイ科	80	139	9,095.75	369	2.60	283	2.62
50	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Xenostrobus atratus	ウツクガイ科							
51	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Mytilidae	ウツクガイ科	120	0.16					
52	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Crassostrea gigas	ウツクガイ科							
53	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Saccostrea kegaki	ウツクガイ科							
54	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Ostreidae	ウツクガイ科							
55	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Claudiconcha japonica	ウツクガイ科			3	0.21	1	+	
56	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Petricola mirabilis	ウツクガイ科							
57	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Petricola sp. cf. lithophaga	ウツクガイ科			7	0.18			
58	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Petricola sp.	ウツクガイ科			1	0.44			
59	軟体動物	二枚貝	ウツクガイ	ウツクガイ	Hiatella orientalis	ウツクガイ科	391	2.15	2,132	44.71	1,760	28.78	
60	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Halosydna brevisetosa	ウツクガイ科			11	0.62	5	0.75	
61	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Harmothoe praeclara	ウツクガイ科							
62	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Lepidonotus elongatus	ウツクガイ科	27	3.22					
63	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Polynoidae	ウツクガイ科	24	2.45	30	2.19	6	0.07	
64	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Eulalia sp.	ウツクガイ科			+		1	+	
65	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Phyllodocidae	ウツクガイ科	35	0.61	40	0.71	17	0.41	
66	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Chrysopetalidae	ウツクガイ科							
67	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Podarkeopsis brevipalpa	ウツクガイ科	3	0.36	28	0.37	13	0.07	
68	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Hesionidae	ウツクガイ科							
69	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Autolytus sp.	ウツクガイ科			47	0.87	11	0.14	
70	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Sphaerosyllis sp.	ウツクガイ科	4	+					
71	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Syllis amica	ウツクガイ科					5	+	
72	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Trypanosyllis taeniaformis	ウツクガイ科					11	0.13	
73	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis aciculata orientalis	ウツクガイ科			3	+			
74	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis adamanteus kurilensis	ウツクガイ科	147	0.99	99	1.12	30	0.34	
75	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis alternata	ウツクガイ科			4	+	50	0.55	
76	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis fasciata	ウツクガイ科	100	1.31	170	1.35	97	0.40	
77	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis nipponica	ウツクガイ科	18	0.37	7	0.10			
78	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Typosyllis sp.	ウツクガイ科							
79	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Syllinae	ウツクガイ科	13	0.21	23	0.23	8	0.07	
80	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Ceratonereis mirabilis	ウツクガイ科							
81	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Neanthes caudata	ウツクガイ科	20	0.39					
82	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Nectoneanthes latipoda	ウツクガイ科							
83	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Nereis heterocirrata	ウツクガイ科							
84	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Nereis multignatha	ウツクガイ科							
85	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Nereis neoneanthes	ウツクガイ科							
86	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Perinereis cultrifera	ウツクガイ科	12	0.40					
87	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Perinereis cultrifera floridana	ウツクガイ科							
88	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Platynereis bicanaliculata	ウツクガイ科							
89	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Eunice kobeensis	ウツクガイ科			2	3.35			
90	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Arabella iricolor	ウツクガイ科			3	0.44			
91	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Schistomeringos rudolphi	ウツクガイ科			11	0.07			
92	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Polydora sp.	ウツクガイ科			20	0.64	22	0.46	
93	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Cirratulus sp.	ウツクガイ科					2	0.35	
94	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Cirriiformia sp.	ウツクガイ科			+		3	0.04	
95	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Cirratulidae	ウツクガイ科			217	12.42	42	2.52	
96	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Acrocirrus validus	ウツクガイ科	219	1.22	298	1.16	5,304	45.08	
97	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Polyopthalmus pictus	ウツクガイ科			11	0.21			
98	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Loimia sp.	ウツクガイ科			6	0.26	11	1.84	
99	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Thelepus sp.	ウツクガイ科			131	24.54	90	16.35	
100	環形動物	多毛	ウツクガイ	ウツクガイ	Terebellidae	ウツクガイ科					2	+	

表 3-7 (2) 坪刈り調査結果 大阪沖埋立処分場 (C-2 付着動物)

No.	門	綱	目	科	種名 /	調査地点		大阪沖				
						検番号	C-2-上		C-2-中		C-2-下	
							項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数
101	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Sabellidae					8	0.03	
102	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Hydroides ezoensis			238	14.13	6	0.34	
103	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Pomatoleios kraussii							
104	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Spirobranchus giganteus							
105	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Spirorbella sp.					1	+	
106	環形動物	多毛	ケリムシ	ケリムシ科	Serpulidae					8	0.12	
107	節足動物	ウグモ	-	-	PCYNOGONIDA							
108	節足動物	顎脚	無柄	ウグモ綱	Ohthamalus challengeri							
109	節足動物	顎脚	無柄	ウグモ綱	Amphibalanus improvisus	3.478	31.76	16	0.41	57	0.71	
110	節足動物	顎脚	無柄	ウグモ綱	Balanus trigonus					4	0.19	
111	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Ampithoe sp.					110	0.32	
112	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Grandidierella sp.							
113	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Aoroides sp.	892	0.22	175	0.07	186	0.10	
114	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Monocorophium sp.					285	0.20	
115	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Erichthonius pugnax					6	0.02	
116	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Jassa sp.	374	0.30	586	0.66	112	0.07	
117	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Elasmopus sp.							
118	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Melita sp.					3	0.03	
119	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Melitidae	53	0.13	30	0.10			
120	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Gitanopsis sp.					5	0.02	
121	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Stenothoe sp.					147	0.16	
122	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Hyalie sp.	308	1.13			11	0.01	
123	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Caprella equilibra					2	+	
124	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Caprella penantis	101	0.21	1,941	3.00	129	0.20	
125	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Caprella scaura	40	0.08	3	+	37	0.03	
126	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Caprella simia					3	+	
127	節足動物	軟甲	端脚	ウグモ綱	Caprella sp.	14	0.02	1,439	0.99	558	0.31	
128	節足動物	軟甲	等脚	ウグモ綱	Janiridae	12	0.02			6	+	
129	節足動物	軟甲	等脚	ウグモ綱	Dynoides dentisinus							
130	節足動物	軟甲	等脚	ウグモ綱	Paracerceis japonica							
131	節足動物	軟甲	ウグモ	ウグモ綱	Apseudidae					1	+	
132	節足動物	軟甲	ウグモ	ウグモ綱	Zeuxo sp.	1	+	326	0.22	123	0.09	
133	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Hippolytidae							
134	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Porcellanidae			7	0.03	1	+	
135	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Pagurus sp.					4	0.03	
136	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Cancer sp.							
137	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Sphaerozium nitidus							
138	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Pugettia quadridentis					1	0.02	
139	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Pugettia sp.	18	0.12	61	1.67	249	0.98	
140	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Pilumnus minutus					10	1.67	
141	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Pilumnus sp.					7	0.16	
142	節足動物	軟甲	十脚	ウグモ綱	Megalopa of Brachyura					1	+	
143	節足動物	昆虫	ハエ	ウグモ綱	Tipulidae					1	+	
144	節足動物	昆虫	ハエ	ウグモ綱	Chironomidae	3.643	0.56	2	+			
145	触手動物	苔虫	ウグモ	ウグモ綱	Phoronis sp.	9	0.07	66	0.68	37	0.28	
146	触手動物	苔虫	管口	ウグモ綱	Tubuliporidae			*		1.28		
147	触手動物	苔虫	櫛口	ウグモ綱	Vesiculariidae							
148	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Calloporidae							
149	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Bugulidae			+		*	0.01	
150	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Scrupocellariidae			*	1.31	*	24.27	
151	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Watersipora subovoidea			*	2.52	*	4.66	
152	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Schizoporellidae			*	1.16	*	0.17	
153	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Microporellidae							
154	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Reteporidae			*	0.03	*	6.45	
155	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Cryptosulidae			*	+	*	0.02	
156	触手動物	苔虫	唇口	ウグモ綱	Celleporinidae							
157	棘皮動物	ヒトデ	ヒトデ	ヒトデ綱	Asterina pectinifera							
158	棘皮動物	ヒトデ	ヒトデ	ヒトデ綱	Asterias amurensis							
159	棘皮動物	ヒトデ	ヒトデ	ヒトデ綱	Ophiactidae			+	6	0.03	2	+
160	棘皮動物	ウニ	ウニ	ウニ綱	Temnopleurus toreumaticus			+				
161	棘皮動物	ナコ	ナコ	ナコ綱	Phylloporidae				23	2.97	10	1.17
162	棘皮動物	ナコ	ナコ	ナコ綱	Sclerodactylidae							
163	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Didemnidae			+		*	1.56	
164	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Ascididae			+				
165	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Perophoridae					*	0.69	
166	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Pyuridae			4	1.37	18	5.78	
167	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Styela clava							
168	脊索動物	ナマコ	ナマコ	ナマコ綱	Styeliidae						15	419.57
169	脊索動物	-	-	-	ASCIDIACEA (colony)			*	0.58	*	0.11	
170	脊索動物	-	-	-	ASCIDIACEA						6	1.09
種類数						46		71		68		
個体数・湿重量(g)合計						90,351	9,252.90	9,489	171.06	10,194	591.04	

注1：単位は個体数・湿重量(g)/0.25m²を示す。
 注2：*は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

3-3 目視による付着動植物調査

3-3-1 植物（海藻）

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-9 に神戸沖埋立処分場の 3 点（A-2、A-4、A-5）における植物の目視観察結果を示した。図 3-4 には、調査測線における代表的な箇所を示した。

・地点 A-2

A-2 の地点では、各水深帯で 1～12 種、全体で 20 種の海藻類が目視観察によって確認された。-1～-3m で種類数が多くなる傾向がみられた。また、-2～-3m で、ワカメ、シダモク、タマハハキモクといった藻場構成種（大型褐藻）が確認された。

表 3-9 (1) 植物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-2)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名 基質	ケソク	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	巨礫						
			緑色植物	緑藻	アオノリ属	+	+							
		アオサ属		20	+	+	+	+						
		シオグサ属			+	+								
黄色植物	褐藻	フクロノリ					+	+						
		ワカメ						5						
		シダモク				5	10							
		タマハハキモク				+								
紅色植物	紅藻	ヒメテングサ		+										
		マクサ			+	+	+	+	+					
		ススカケベニ										+	+	
		ツノマタ属			+									
		ムカデノリ				+	+							
		フダラク			+	5								
		ツルツル				+								
		ムカデノリ科			+	+	+	+	+	+	+			
		オキツノリ				+	+							
		ベニスナゴ							+	+	+			
		カバノリ			5	+	+	+	+	5	+			
		イギス目			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
藍色植物	藍藻	藍藻綱	+											
出現種類数			2	3	8	12	10	6	5	4	4	2	2	1

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面±0m

平均水面-3.0m

平均水面-8.0m

図 3-4 (1) 代表的な調査箇所状況 (A-2)

・地点 A-4

A-4 の地点では、各水深帯で 0～8 種、全体で 13 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m および-10m では海藻類は確認できず、-1～-4m で種類数が増える傾向がみられた。また、-1～-5m で藻場構成種（大型褐藻）であるワカメが確認された。

表 3-9 (2) 植物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-4)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			ブロック											
緑色植物	緑藻	アオサ属		+	+	+	+	+						
		シオグサ属		+	+	+								
黄色植物	褐藻	ワカメ			5	10	20	5	+					
紅色植物	紅藻	マクサ					+		+	+				
		ススカケベニ									+	+		
		フダラク			5									
		ツルツル			+									
		ムカデノリ科			+	+	+	+						
		オキツノリ			+			+						
		ベニスナゴ								+	+			
		カバノリ				+	+	+	+	+	+	+	+	
		イギス目			+	+	+	+	5	5	+	+	+	
		藍色植物	藍藻	藍藻綱		+								
出現種類数			0	3	8	6	6	6	5	4	3	3	1	0

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面+1.0m

平均水面-3.0m

平均水面-7.0m

図 3-4 (2) 代表的な調査箇所(A-4)

・地点 A-5

A-5 の地点では、各水深帯で 0～9 種、全体で 12 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m、±0m と -11m では海藻類は確認できず、-2～-4m で種類数が多くなる傾向がみられた。藻場構成種（大型褐藻）の生育は確認されなかった。

表 3-9 (3) 植物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-5)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
門	綱	種名	基質												
			ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫巨礫	砂泥
緑色植物	緑藻	アオノリ属			+	+									
		アオサ属			+	+	+	+							
		シオグサ属			+	+	+	+							
黄色植物	褐藻	フクロノリ					+	+	+						
緑色植物	紅藻	サンゴモ科						+	+	+	+	+	+	+	
		マクサ			+	+		+							
		ススカケベニ						5							
		ツルツル				+	+								
		ムカデノリ科				+	+	+	+	+					
		ベニスナゴ					+	5	+	+					
		カバノリ					+								
		イギス目				+	5	5	5	10	5	+	+	+	
		出現種類数			0	0	4	7	8	9	5	4	2	2	2

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。
2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面-2.0m

平均水面-5.0m

平均水面-9.0m

図 3-4 (3) 代表的な調査箇所状況 (A-5)

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-10 に大阪沖埋立処分場の 3 点 (C-1、C-2、C-3) における植物の目視観察結果を示した。図 3-5 には、調査測線における代表的な箇所を示した。

・地点 C-1

C-1 の地点では、各水深帯で 0~9 種、全体で 14 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m では海藻は確認されず、-5~-7m で種類数が多くなっていた。また、-2~-3m と-5m でワカメ、-5m でシダモクといった藻場構成種 (大型褐藻) が確認され、特に-2m ではワカメが繁茂していた。

表 3-10 (1) 植物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-1)

調査日：平成30年6月3日

			平均水面からの高さ (m)												
門	綱	種名 基質	+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
			ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	
緑色植物	緑藻	アオノリ属		+	+										
		アオサ属			+	+	+		+						
		シオグサ属			+	+									
黄色植物	褐藻	フクロノリ						+		+					
		ワカメ				30	5		+						
		シダモク							+						
紅色植物	紅藻	サンゴモ科							+	5	+	+	+	+	
		ススカケベニ								+	5	+	+		
		ムカデノリ								+	+				
		フダラク							+	+					
		ツルツル								+	+	+			
		ベニスナゴ								5	20	20			
		カバノリ				+	+	+	+	+	+	+	5		
イギス目				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
出現種類数			0	1	3	5	4	4	9	8	7	4	3	2	

備考 1) 出現種の各数値は被度 (%) を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面 ±0.0m

平均水面 -6.0m

平均水面 -10.0m

図 3-5 (1) 代表的な調査箇所の状況 (C-1)

・地点 C-2

C-2 の地点では、各水深帯で 0～7 種、全体で 14 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m では海藻は確認されず、-1～-4m で種類数が多くなっていた。-1m でフダラク、-5～-6m でベニスナゴの被度が高くなっていた。また、-1～-4m で藻場構成種（大型褐藻）であるワカメが確認された。

表 3-10 (2) 植物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-2)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
緑色植物	緑藻	アオノリ属		+										
		アオサ属		+	+	+	+							
		シオグサ属		+	+									
黄色植物	褐藻	フクロノリ					+	+						
		ワカメ			5	20	10	5						
紅色植物	紅藻	サンゴモ科						+	20	20	20	10	+	+
		マクサ							+					
		ススカケベニ								+	+	+	+	
		ツノマタ属			5	5	20	+						
		フダラク			30	20	20							
		ツルツル			+	+								
		ベニスナゴ						+	40	50	10			
		カバノリ				5	+	+	5	+	+			
		イギス目			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		出現種類数			0	3	7	7	7	7	5	5	5	3

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面-1.0m

平均水面-5.0m

平均水面-8.0m

図 3-5 (2) 代表的な調査箇所状況 (C-2)

・地点 C-3

C-3 の地点では、各水深帯で 0～10 種、全体で 15 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m では海藻は確認されず、-1～-3m で種類数が多くなる傾向がみられた。また、-1～-3m ではワカメ、-3m ではシダモク、-1～-2m ではタマハハキモクといった藻場構成種（大型褐藻）が確認された。

表 3-10 (3) 植物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-3)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ (m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
門	綱	種名 基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	
緑色植物	緑藻	アオサ属		+	+	+	+								
		シオグサ属		+	+	+									
黄色植物	褐藻	フクロノリ					+								
		ワカメ			5	5	10								
		シダモク					5								
		タマハハキモク			10	+									
紅色植物	紅藻	サンゴモ科			+	+	5	+	5	20	10	5	5	5	
		マクサ					+	+	+						
		ススカケベニ										+	+		
		フダラク			5	+	+								
		ツルツル			+	5	+								
		イワノカワ科								20	5	5	5	+	
		ベニスナゴ							+	10	+	10			
		カバノリ			+	5	5	+	+						
イギス目			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
出現種類数			0	2	9	9	10	5	6	4	4	4	4	2	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面±0.0m

平均水面-3.0m

平均水面-9.0m

図 3-5 (3) 代表的な調査箇所状況 (C-3)

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-11 に泉大津沖埋立処分場の 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6) における植物の目視観察結果を示した。図 3-6 には、調査測線における代表的な箇所を示した。

・地点 D-2

D-2 の地点では、各水深帯で 0~10 種、全体で 15 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1m、-12~-13m では海藻は確認されず、-1~-6m で種類数が増える傾向がみられた。-1m でアオサ属、-4m と-6m でフダラク、-5~-6m ではタオヤギソウの被度が高くなっていた。また、-1~-6m で藻場構成種 (大型褐藻) であるワカメの繁茂が観察された。

表 3-11 (1) 植物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
門	綱	種名	基質																
			ブロック	転石	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	泥								
緑色植物	緑藻	アオノリ属				+	+												
		アオサ属		+	30	+	+												
		シオグサ属		+	+														
黄色植物	褐藻	ワカメ			20	50	20	20	5	+									
紅色植物	紅藻	マクサ			5	+	+												
		ススカケベニ									+	+	+	+	+	+			
		スギノリ属			+														
		ムカデノリ		+	+	+	10	+											
		フダラク		+	5	5													
		ツルツル			+			+			+								
		ベニスナゴ							+	+									
		カバノリ			+	+	10	30	20	30	5	+							
		コスジフシツナギ			+														
		タオヤギソウ						20	30	30	20	+	+						
		イギス目						+			+	+	+	+	+	+			
出現種類数			0	4	10	7	8	5	4	7	4	4	3	2	2	0	0		

備考 1) 出現種の各数値は被度 (%) を示す。
2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面-1.0m

平均水面-4.0m

平均水面-11.0m

図 3-6 (1) 代表的な調査箇所の状況 (D-2)

・地点 D-3

D-3 の地点では、各水深帯で 0~7 種、全体で 9 種の海藻類が目視観察によって確認された。+1~±0 m、-13m では海藻が確認されず、-2~-4m で種類数が多くなっていった。また、-1~-5m、-7m で藻場構成種（大型褐藻）であるワカメが確認され、特に-2 m ではワカメの繁茂が観察された。

表 3-11 (2) 植物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-3)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
門	綱	種名	基質															
			ケソソ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫									
緑色植物	緑藻	アオサ属			5	+	+											
		シオグサ属			5	+		+										
		ミル				+												
黄色植物	褐藻	ワカメ			+	30	+	+	+		+							
紅色植物	紅藻	マクサ				+	+	+	+	+								
		ススカケベニ			+	+	+	5	5	+	5	+	+	+				
		カバノリ					+					5	+					
		タオヤギソウ							+	+	+	5	+					
		イギス目			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
出現種類数			0	0	4	7	6	6	5	4	5	4	2	2	1	1	0	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。
2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面±0.0m

平均水面-4.0m

平均水面-7.0m

図 3-6 (2) 代表的な調査箇所状況 (D-3)

・地点 D-5

D-5 の地点では、藻類は確認されなかった。

表 3-11 (3) 植物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-5)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			エコ岸壁					遊水室					
			壁面										
			+1	±0	-1	-2	-3	ケ-ソ	石網	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	上面
門	綱	種名	ケ-ソ	石網	ケ-ソ								
出現種なし													
出現種類数			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面±0.0m

平均水面-3.0m

遊水室側面

図 3-6 (3) 代表的な調査箇所状況 (D-5)

・地点 D-6

D-6 の地点では、各水深帯で 0~9 種類、全体で 14 種類の海藻類が目視観察によって確認された。+1m と遊水室の上室の上面、側面、下室の上面では海藻が確認されず、-2m で最も種類数が多くなっていた。-4~5m ではタオヤギソウの被度が高くなっていた。また、-1m と-4m では藻場構成種（大型褐藻）であるワカメが確認された。

表 3-11 (4) 植物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-6)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			エコ岸壁																	
			壁面							遊水室										
			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	上室			下室							
門	綱	種名	基質	ケ-ソ	石網 (網欠損)	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	上面	側面	下面	上面	側面	下面			
緑色植物	緑藻	アオノリ属				+	+													
		アオサ属		+	+	+	+								+					
		シオグサ属		+	+	+	+													
黄色植物	褐藻	ワカメ				10				+										
紅色植物	紅藻	イソダンツウ		+																
		ススカケベニ					+	+	+		10							+		
		ムカデノリ				10	+								+				+	
		フダラク																	+	
		ツルツル							+						+					
		ムカデノリ科					+	+												
		カバノリ						+	5	+	+								+	
		コスジフシツナギ					+													
		タオヤギソウ							+	20	60	40							+	5
		イギス目					+	+	+											
出現種類数				0	5	7	9	6	4	3	0	0	3	0	1	5				

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を示す。
2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

平均水面-1.0m

平均水面-4.0m

遊水室下室下面

図 3-6 (4) 代表的な調査箇所状況 (D-6)

3-3-2 動物（付着動物）

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-12 に神戸沖埋立処分場の 3 点（A-2、A-4、A-5）における動物の目視観察結果を示した。図 3-7 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 A-2

A-2 の地点では、各水深帯で 1～9 種、全体で 21 種の付着動物が目視観察によって確認され、-5m で種類数が最も多くなっていた。+1m で巻貝のアラレタマキビの個体数が非常に多く、±0m で二枚貝のムラサキイガイの被度が高くなっていた。

表 3-12 (1) 動物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-2)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			ケ-ソソ	ブ'ロック	ブ'ロック	ブ'ロック	ブ'ロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	
刺胞動物	花虫	タテジマイソギンチャク		+										
		シオガマサンゴ科							+					
軟体動物	腹足	アラレタマキビ	(172)											
		タマキビ	(3)											
		裸鰓目								(1)		(1)		
		カラマツガイ		(1)										
	二枚貝	ムラサキイガイ		40	+									
		イタボガキ科		+										
		キクザルガイ科							+	+				
環形動物	多毛	ミズヒキゴカイ科				+	+	+						
		カンザシゴカイ科			+	5	5	5	+	+	+	+	+	
節足動物	顎脚	イワフジツボ	+	+										
		サンカクフジツボ			+	+	+	+	+	+	+	+		
触手動物	筍虫	Phoronis属				+	+	+						
	苔虫	苔虫綱			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ						(1)	(1)					
		キヒトデ			(3)	(1)	(1)	(2)	(1)			(1)		
	ナマコ	マナマコ						(1)						
脊索動物	ホヤ	エボヤ					+							
		ホヤ綱 (群体性)										+		
		ホヤ綱 (単体性)								+	+			
出現種類数			3	5	5	6	7	8	9	5	4	5	2	1

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。
 2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・地点 A-4

A-4 の地点では、各水深帯で 2～9 種、全体で 21 種の付着動物が目視観察によって確認され、-2～-5m で種類数が多くなっていた。+1m で巻貝のアラレタマキビの個体数が非常に多く、±0～-1m で二枚貝のムラサキガイの被度が極めて高くなっていた。また、キヒトデが-1～-10m の広い範囲でみられた。

表 3-12 (2) 動物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-4)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ (m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱			+		+							
刺胞動物	花虫	タテジマイソギンチャク		+										
軟体動物	腹足	ヨメガカサ		(1)										
		コモレビコガモガイ		(5)										
		アラレタマキビ	(104)											
		オオヘビガイ				+								
		裸鰓目					(1)							
		カラマツガイ		(5)										
	二枚貝	ムラサキガイ		60	40	+								
		イタボガキ科		+	+									
		キクザルガイ科								+				
環形動物	多毛	ミズヒキゴカイ科						+	+	+				
		カンザシゴカイ科		+	+	5	+	+	+	+	+	+	+	+
節足動物	顎脚	イワフジツボ	+	+										
		サンカクフジツボ					+	+	+	+	+	+	+	
触手動物	筍虫	Phoronis属				+	+	+	+					
	苔虫	苔虫綱			+	5	+	+	+	+	+	+	+	
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ								(1)		(1)		
		キヒトデ			(1)	(3)	(5)	(8)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱 (群体性)				5	+	+	+					
		ホヤ綱 (単体性)				+	+	+	+	+	+	+		
出現種類数			2	8	6	8	9	8	9	7	5	6	4	2

備考 1) 出現種の各数値は被度 (%) を、() 内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・地点 A-5

A-5 の地点では、各水深帯で 0~10 種、全体で 19 種の付着動物が目視観察によって確認された。+1 m、-11m では付着生物は確認されず、-3m で種類数が最も多くなっていた。±0m で巻貝のアラレタマキビの個体数が多く、±0m ではイワフジツボ、±0~-2m で二枚貝のムラサキイガイ、-2~-3m でカンザシゴカイ科、-9m で苔虫綱の被度が高くなっていた。中でも、ムラサキイガイについては-1m での被度が極めて高くなっていた。また、イトマキヒトデ、キヒトデが-3~-9m の広い範囲でみられた。

表 3-12 (3) 動物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-5)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ (m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
門	綱	種名	基質												
			ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫巨礫	砂泥
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱						+							
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱				+	+								
	花虫	イソギンチャク目		+	+										
		シオガマサンゴ科											+	+	
軟体動物	腹足	アラレタマキビ		(16)											
	二枚貝	ムラサキイガイ		20	70	30	+								
		イタボガキ科		5		+		+	+	+					
環形動物	多毛	ケヤリムシ科								+	+	+			
		カンザシゴカイ科		+	+	10	10	5	+	+	+	+	+	+	
節足動物	顎脚	イワフジツボ		30											
		サンカクフジツボ						+	+	+	+	+	+	+	+
触手動物	筈虫	Phoronis属				+	+								
	苔虫	苔虫綱			+	+	+	+	+	+	+	5	10	5	
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ					(1)	(1)	(1)		(1)		(1)		
		キヒトデ					(1)	(2)	(3)	(1)		(1)	(1)		
		サンショウウニ					(1)				(1)				
	ナマコ	マナマコ										(1)			
脊索動物	ホヤ	エボヤ				+	+	+		+	+	+	+		
		ホヤ綱 (群体性)			+	+	+			+					
出現種類数			0	6	5	8	10	8	6	8	7	7	7	4	0

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。
 2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-13 に大阪沖埋立処分場の 3 点 (C-1、C-2、C-3) における動物の目視観察結果を示した。図 3-7 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 C-1

C-1 の地点では、各水深帯で 1~10 種、全体で 22 種の付着動物が目視観察によって確認され、-3m で種類数が最も多くなっていた。+1m では巻貝のアラレタマキビの個体数が多く、±0~-2m では二枚貝のムラサキイガイ、±0m では二枚貝のイタボガキ科とイワフジツボの被度が高くなっていた。中でも、ムラサキイガイについては、-1~-2m の被度が非常に高くなっていた。また、キヒトデが-3~-10m の広い範囲で見られた。

表 3-13 (1) 動物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-1)

調査日：平成30年6月3日

門	綱	種名	平均水面からの高さ(m)												
			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
		基質	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱				+	+	+			+				
刺胞動物	花虫	タテジマイソギンチャク		+			+								
		イソギンチャク目			+	+									
軟体動物	腹足	コモレビコガモガイ		(6)											
		アラレタマキビ	(36)												
		シマメノウフネガイ									(1)	(2)			
		裸鰓目											(1)		
	二枚貝	カラマツガイ		(8)											
		ムラサキイガイ		10	70	60	+								
		イタボガキ科		20											
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科		+	+	+	5	5	+	+	+	+	+	+	
節足動物	顎脚	イワフジツボ		20											
		サンカクフジツボ								+	+	+	+		
触手動物	筍虫	Phoronis属					+	+							
	苔虫	苔虫綱			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ													(1)
		キヒトデ					(1)	(6)	(7)	(5)	(6)	(9)	(3)	(4)	
		サンショウウニ						(1)							
	ナマコ	マナマコ							(1)						
脊索動物	ホヤ	エボヤ				+	+								
		ホヤ綱(群体性)				+	+	5							
		ホヤ綱(単体性)				+	+	+							
出現種類数			1	7	4	8	10	8	5	6	5	5	3	4	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・地点 C-2

C-2 の地点では、各水深帯で 2～8 種、全体で 20 種の付着動物が目視観察によって確認され、-3～-4m で種類数が最も多くなっていた。+1m では巻貝のアラレタマキビの個体数が非常に多く、±0m では巻貝のカラマツガイが多く見られ、±0～-1m では二枚貝のムラサキガイの被度が極めて高くなっていた。

表 3-13 (2) 動物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-2)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			フ'ロツク	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫						
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱				+	+	5	+	+				
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱										+	+	
	花虫	タテジマイソギンチャク		+										
		イソギンチャク目					+							
		シオガマサンゴ科										+	+	
軟体動物	腹足	コモレビコガモガイ		(7)										
		アラレタマキビ	(136)											
		オオヘビガイ					+	+	+	+				
		シマメノウフネガイ											(1)	(1)
		カラマツガイ		(12)										
		キクノハナガイ		(3)										
	二枚貝	ムラサキガイ		80	60									
		イタボガキ科		+										
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科			+	5	5	5	+	+	+	+	+	
節足動物	顎脚	イワフジツボ	+											
触手動物	蓍虫	Phoronis属				+	+	+						
	苔虫	苔虫綱			+	+	+	5	+	5	+	+	+	
棘皮動物	ヒトデ	キヒトデ					(1)		(2)	(1)				
	ウニ	サンショウウニ						(1)						
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱(群体性)			+	+	+	+	+					
出現種類数			2	6	4	5	8	8	6	5	3	5	3	2

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・ 地点 C-3

C-3 の地点では、各水深帯で 1～7 種、全体で 13 種の付着動物が目視観察によって確認され、-3m で種類数が最も多くなっていた。+1m では巻貝のアラレタマキビの個体数が多く、±0m では二枚貝のムラサキイガイの被度が非常に高く、-1～-3m ではカンザシゴカイ科、-6～-7m では苔虫綱の被度が高くなっていた。また、キヒトデが-2～-10m の広い範囲でみられた。

表 3-13 (3) 動物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-3)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
門	綱	種名 基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	
			海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱			+		+	+				
刺胞動物	花虫	シオガマサンゴ科												+	
軟体動物	腹足	アラレタマキビ	(28)												
		オオヘビガイ				+	+		+	+					
		カラマツガイ		(1)											
		キクノハナガイ		(1)											
	二枚貝	ムラサキイガイ		90	5										
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科			10	20	20	+	+	+	+	+	+		
触手動物	筍虫	Phoronis属				+		+							
		苔虫綱			5	5	5	+	10	10	+	+	+		
棘皮動物	ヒトデ	キヒトデ				(1)	(1)		(1)	(1)	(2)		(1)	(2)	
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱 (群体性)				+	+	+		+	+				
		ホヤ綱 (単体性)					+	+	+						
出現種類数			1	3	3	6	7	6	5	5	4	2	3	3	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-14 に泉大津沖埋立処分場の 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6) における動物の目視観察結果を示した。図 3-7 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 D-2

D-2 の地点では、各水深帯で 0~13 種、全体で 32 種の付着動物が目視観察によって確認された。-12~-13m では付着動物は確認されず、±0m で種類数が最も多くなっていた。+1m で巻貝のアラレタマキビの個体数が非常に多く、±0m ではイワフジツボの被度が高かった。-2m でヒドロ虫綱、-2~-6m で苔虫綱、-3m で尋常海綿綱、-3~-5m でカンザシゴカイ科の被度が高くなっていた。また、イトマキヒトデ、キヒトデが-4~-11m の広い範囲でみられた。

表 3-14 (1) 動物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ (m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
門	綱	種名	基質															
			ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	転石	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	泥
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱			5	+	10			+		+			+	+		
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱			+	10	+	+	+	+								
		花虫	タテジマイソギンチャク		+	+												
			イソギンチャク目			+												
		シオガマサンゴ科															+	
軟体動物	多板	ヒメケハダヒザラガイ		(2)														
		腹足	ベッコウガサ		(1)													
			マツバガイ		(2)													
			ヨメガカサ		(8)													
			コモレビコガモガイ		(8)													
			ウノアシ		(5)													
			コシダカガンガラ								(2)							
			アラレタマキビ	(244)														
			オオヘビガイ						+	+								
			シマノウフネガイ										(1)	(2)	(1)			
		レイシガイ							(2)									
		イボニシ		(3)	(3)													
		裸鰓目						(1)	(1)									
		カラマツガイ		(3)														
		キクノハナガイ		(1)	(1)													
	二枚貝	イタボガキ科		5														
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科			+	+	10	10	10	+	+	+	+	+	+			
節足動物	顎脚	イワフジツボ	+	10														
			クロフジツボ		+													
			サンカクフジツボ					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
触手動物	筍虫	Phoronis属			+	+	+											
	苔虫	苔虫綱			+	10	20	10	20	10	+	+	+	+	+			
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ						(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)					
			キヒトデ						(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(2)	(2)			
			マナコ	マナコ							(1)							
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱 (群体性)			+	+	+	+										
			ホヤ綱 (単体性)					+							+			
出現種類数			2	13	9	7	8	7	10	9	4	6	6	7	5	0	0	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・地点 D-3

D-3 の地点では、各水深帯で 0～11 種、全体で 25 種の付着動物が目視観察によって確認された。-13m では付着動物は確認されず、-3m で最も種類数が多かった。+1～±0m で巻貝のアラレタマキビの個体数が非常に多く、±0m ではヨメガカサ、コモレビコガモガイといった巻貝が多くみられた他、イワフジツボの被度が高かった。-1～-2m では二枚貝のムラサキガイの被度が非常に高く、-2～-6m でカンザシゴカイ科、-3～-6m、-10m、-12m で苔虫綱の被度が高くなっていた。また、-2～-12m の広い範囲でキヒトデがみられた。

表 3-14 (2) 動物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-3)

			調査日：平成30年5月26日															
平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
門	綱	種名	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	ケソソ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥	
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱				+	+						+	+				
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱						+	+									
	花虫	タテジマイソギンチャク		+	+													
		イソギンチャク目				+	+											
		シオガマサソゴ科													+		+	
軟体動物	腹足	ヨメガカサ		(11)														
		コモレビコガモガイ		(14)														
		ウノアシ		(2)	(3)													
		アラレタマキビ	(212)	(96)														
		オオヘビガイ									+							
		シマメノウフネガイ												(1)	(1)			
		レイシガイ				(3)	(4)	(3)										
		イボニシ		(3)														
		カラマツガイ		(4)														
	二枚貝	ムラサキガイ			70	50	+											
		イタボガキ科		+														
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科			+	10	10	20	20	20	+	+	+	+	+	+	+	
節足動物	顎脚	イワフジツボ		30														
		サンカクフジツボ									+	+	+	+				
触手動物	薺虫	Phoronis属					+	+										
	苔虫	苔虫綱			+	+	10	10	10	10	+	+	5	10	5	10		
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ						(1)	(1)	(1)								
		キヒトデ				(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(1)	(1)		
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱 (群体性)				+	+	+	+	+								
		ホヤ綱 (単体性)					+	+	+									
出現種類数			1	9	5	8	11	9	5	6	4	5	6	6	3	4	0	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

・地点 D-5

D-5 の地点では、各水深帯で 1~12 種、全体で 16 種の付着動物が目視観察によって確認され、-1~-3m 付近や遊水室の各面で種類数が多くなる傾向がみられた。±0m では巻貝のイボニシが、-1m では同じく巻貝のレイシガイが多くみられた。また、±0m では二枚貝のムラサキイガイ、±0~-3m ではカンザシゴカイ科、-1~-3m では苔虫綱の被度が高くなっていた。なお、遊水室内の上面ではムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、Phoronis 属、苔虫綱の、側面では苔虫綱の被度が高かった。上面、下面ではレイシガイが多数みられた。

表 3-14 (3) 動物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-5)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ (m)			エコ岸壁								
			壁面					遊水室			
			+1	±0	-1	-2	-3	上面	側面	下面	
門	綱	基質 種名	ケ-ソ	石網	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	上面	側面	下面
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱			+	+	+		+	+	+
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱			+	+	+		+	+	+
	花虫	イソギンチャク目			+	+	+				
軟体動物	腹足	アラレタマキビ	(3)								
		シマメノウフネガイ						(1)			
		レイシガイ			(84)	(7)	(3)		c	r	c
		イボニシ		(36)							
	二枚貝	ムラサキイガイ		30	+				30	+	+
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科		10	20	20	10		10	5	5
触手動物	筍虫	Phoronis属			+				30	5	+
	苔虫	苔虫綱			20	30	30		20	40	+
棘皮動物	ヒトデ	イトマキヒトデ			(1)				r	r	r
		キヒトデ			(1)	(1)			r	r	r
	ウニ	サンショウウニ			(1)	(1)	(1)		r	rr	r
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱 (群体性)			+	+					
		ホヤ綱 (単体性)				+	+		+	+	
出現種類数			1	3	12	10	9		11	11	10

備考 1) 出現種の各数値は被度 (%) を、() 内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

3) 遊水室で個体数計数が可能な出現種はCR法による概数を把握し、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

・地点 D-6

D-6 の地点では、各水深帯で 3～12 種、全体で 17 種の付着動物が目視観察によって確認され、-2m 付近や遊水室の上室の上面、側面などで種類数が多くなる傾向がみられた。+1m では巻貝のアラレタマキビの個体数が多く、イワフジツボの被度が高くなっていた。また、±0～-1m で二枚貝のムラサキイガイの被度が非常に高く、-1m でイソギンチャク目とヨーロッパフジツボ、-1～-3m で苔虫綱、-2～-4m でカンザシゴカイ科、-3～-4m でホヤ綱（単体性）の被度が高くなっていた。なお、遊水室内の上室ではイソギンチャク目、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、Phoronis 属、苔虫綱の被度が高く、下室の上面、側面では苔虫綱の被度が極めて高くなっていた。

表 3-14 (4) 動物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-6)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			エコ岸壁													
			壁面						遊水室							
			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	上室			下室			
門	綱	種名	ケ-ソ	石網 (網欠損)	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	上面	側面	下面	上面	側面	下面
海綿動物	尋常海綿	尋常海綿綱									+	+		+		
刺胞動物	ヒドロ虫	ヒドロ虫綱									+	+		+	+	
	花虫	イソギンチャク目			10	+	+				30	10	5	+	+	+
軟体動物	腹足	アラレタマキビ	(48)													
		タマキビ	(4)													
		レイシガイ		(2)		(1)					r	r	r	r	r	r
	二枚貝	ホトトギスガイ		+												
		ムラサキイガイ		60	50	+					10	10	+	+	+	
環形動物	多毛	カンザシゴカイ科		+	+	10	10	10	+		10	+	40	5	+	+
節足動物	顎脚	イワフジツボ	20													
		ヨーロッパフジツボ			10	+						+				
		サンカクフジツボ			+	+	+	+	+							
触手動物	筍虫	Phoronis属				+	+	+	+				20			
	苔虫	苔虫綱			10	10	10	+	+	+	20	30		50	60	
棘皮動物	ヒトデ	キヒトデ		(1)	(1)	(2)		(2)	(1)		r	r	r	r	r	r
脊索動物	ホヤ	ホヤ綱（群体性）			+	+		+	+		+	+		+		
		ホヤ綱（単体性）			+	+	10	10	+		10	+	+			+
出現種類数			3	5	9	11	6	7	7	10	12	6	9	7	5	

備考 1) 出現種の各数値は被度(%)を、()内の値は個体数を示す。

2) +表示は被度が5%未満であることを示す。

3) 遊水室で個体数計数が可能な出現種はCR法による概数を把握し、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1～2個体, r:3～10個体, c:11～50個体, cc:51個体以上

イソギンチャク目

ヨメガカサ

コモレビコガモガイ

アラレタマキビ

レイシガイ

ムラサキイガイ・イタボガキ科

図 3-7 (1) 目視調査における主な付着動物の確認種 (神戸沖・大阪沖・泉大津沖埋立処分場)

カンザシゴカイ科

イワフジツボ

苔虫綱

イトマキヒトデ

キヒトデ

ホヤ綱 (単体性)

図 3-7 (2) 目視調査における主な付着動物の確認種 (神戸沖・大阪沖・泉大津沖埋立処分場)

3-3-3 ブロック側面、裏面の状況（付着動植物）

各処分場において護岸にブロックを用いている神戸沖埋立処分場の2点(A-2、A-4)、大阪沖埋立処分場の2点(C-2、C-3)、泉大津沖埋立処分場の1点(D-2)においては、ブロック側面、裏面の状況を、目視および写真撮影により確認した。

(1) 神戸沖埋立処分場

表3-15に神戸沖埋立処分場の2点(A-2、A-4)におけるブロック各面の動植物の目視観察結果を示した。図3-8には、ブロック各位置の付着動植物の状況写真をまとめた。

・地点 A-2

±0mでは各面でアオサ属、二枚貝のムラサキガイなどが、-1~-3mではシダモク、カンザシゴカイ科、苔虫綱、キヒトデなどが確認された。全体的に、上面、側面、裏面での付着生物相の大きな変化は認められなかった。

表3-15 (1) 動植物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-2)

A-2	平均水面(m)	±0	-1	-2	-3	
	位置	基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック
主要種※	上面		アオサ属 ムラサキガイ	キヒトデ	—	シダモク
	右側面		アオサ属 カラマツガイ ムラサキガイ	カンザシゴカイ科 キヒトデ	シダモク カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科 苔虫綱
	左側面		アオサ属 カラマツガイ ムラサキガイ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱
	裏面		アオサ属 カラマツガイ ムラサキガイ イタボガキ科 イワフジツボ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	シダモク カンザシゴカイ科 苔虫綱	ムカデノリ カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱 キヒトデ

※主要種: 上面については観察時の被度が10%以上または個体数が3個体以上の種を抽出
側面・裏面については現地写真により種の判別が可能な種を記述

注1) 緑の文字は植物を黒の文字は動物を示す。

平均水面 (m)	ブロック			
	上面	右側面	左側面	裏面
±0
-1
-2
-3

図 3-8 (1) ブロック各位置の付着動植物の状況 (神戸沖埋立処分場 A-2)

・地点 A-4

+1m では各面に小型の巻貝のアラレタマキビが多くみられた。±0 m では各面にムラサキイガイが多く付着していた。-1m では上面を除く各面に藻場構成種(大型褐藻)であるワカメや紅藻のフダラクがよく繁茂し、各面にはムラサキイガイが多くみられた。-2~-5m では各面でワカメが繁茂し、上面ではキヒトデが、他の3面では尋常海綿綱、イワガキ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、キヒトデ、ホヤ綱などがよくみられた。また、-4~-5m の裏面ではマナマコの生息を確認した。-6m 以深では、各面に苔虫綱、キヒトデなどがみられた。

表 3-15 (2) 動植物 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-4)

A-4	平均水面(m)	+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
	位置 基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック砂泥	
主要種※	上面	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ カラマツガイ ムラサキイガイ	ムラサキイガイ	ワカメ キヒトデ	ワカメ キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	-	-	-	-	
	右側面	コモレビコガモガイ アラレタマキビ イワフジツボ	ムラサキイガイ	ワカメ イソギンチャク目 ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	ワカメ 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	ワカメ カンザシゴカイ科 キヒトデ	ワカメ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	ワカメ イワガキ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	カンザシゴカイ科 カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	キヒトデ	苔虫綱 キヒトデ	苔虫綱	-	-
	左側面	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	ワカメ フダラク ムラサキイガイ	ワカメ 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 ホヤ綱(群体性)	ワカメ カンザシゴカイ科 キヒトデ ホヤ綱(群体性)	ワカメ イワガキ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	ワカメ イワガキ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	カンザシゴカイ科 カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	キヒトデ	苔虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱	-
	裏面	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	ワカメ フダラク ムラサキイガイ	ワカメ 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 キヒトデ ホヤ綱(群体性)	ワカメ 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	ワカメ イワガキ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ マナマコ	ワカメ イワガキ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ マナマコ	カンザシゴカイ科 カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ マナマコ	苔虫綱 キヒトデ	苔虫綱	苔虫綱	-	-

※主要種:上面については観察時の被度が10%以上または個体数が3個体以上の種を抽出
側面・裏面については現地写真により種の判別が可能な種を記述

注1) 緑の文字は植物を黒の文字は動物を示す。

平均水面 (m)	ブロック			
	上面	右側面	左側面	裏面
+1				
±0				
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				
-6				
-7				
-8				
-9				
-10				

図 3-8 (2) ブロック各位置の付着動植物の状況 (神戸沖埋立処分場 A-4)

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-16 に大阪沖埋立処分場の 2 点 (C-2、C-3) におけるブロック各面の動植物の目視観察結果を示した。図 3-9 には、ブロック各位置の付着動植物の状況写真をまとめた。

・地点 C-2

+1m では各面で巻貝のアラレタマキビが多く生息していた。±0～-3m では各面に紅藻のフダラクが繁茂しており、-3～-4m の各面では紅藻のツノマタ属が生育していた。±0～-1m では二枚貝のムラサキイガイが多くみられ、±0m の上面ではコモレビコガモガイ、カラマツガイ、キクノハナガイなどの小型の巻貝類が多くみられた。-2m 以深では、上面以外の 3 面で尋常海綿綱、カンザシゴカイ科、苔虫綱、ホヤ綱 (群体性) などが確認された。藻場構成種 (大型褐藻) としては、-1～-4m の多くの面でワカメが繁茂し、-3m の裏面でシダモクが確認された。

表 3-16 (1) 動植物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-2)

C-2	平均水面(m)	+1	±0	-1	-2	-3	-4
	位置 基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック
主要種※	上面	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ カラマツガイ キクノハナガイ ムラサキイガイ	フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク	ワカメ ツノマタ属 フダラク	-
	右側面	アラレタマキビ	フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク キヒトデ ホヤ綱(群体性)	ワカメ フダラク 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	ワカメ ツノマタ属 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科
	左側面	アラレタマキビ	フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク 苔虫綱 ホヤ綱(群体性)	ワカメ ツノマタ属 フダラク 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	ツノマタ属 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科
	裏面	アラレタマキビ	フダラク ムラサキイガイ	ワカメ フダラク ムラサキイガイ キヒトデ ホヤ綱(群体性)	ワカメ フダラク 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	ワカメ シダモク ツノマタ属 フダラク カンザシゴカイ科 ホヤ綱(群体性)	ツノマタ属 カンザシゴカイ科 苔虫綱

※主要種: 上面については観察時の被度が 10% 以上または個体数が 3 個体以上の種を抽出

側面・裏面については現地写真により種の判別が可能な種を記述

注 1) 緑の文字は植物を黒の文字は動物を示す。

平均水面 (m)	ブロック			
	上面	右側面	左側面	裏面
+1
±0
-1
-2
-3
-4

図 3-9 (1) ブロック各位置の付着動植物の状況 (大阪沖埋立処分場 C-2)

・地点 C-3

+1m では各面で巻貝のアラレタマキビが多く生息していた。±0m の各面ではムラサキイガイが多くみられ、左側面では巻貝のイボニシが生息していた。-1~-3m の上面を除く他の3面では紅藻のフダラク、カバノリがよく繁茂し、-1m 以深では、各面でカンザシゴカイ科が多く付着していた。-2~-4m の上面を除く他の3面では尋常海綿綱、カンザシゴカイ科、苔虫綱、キヒトデ、ホヤ綱などが確認された。藻場構成種（大型褐藻）としては、-1m の右側面と左側面、-3m の右側面以外の3面、-4m の左側面でワカメが、-3m の右側面、-4m の左側面でシダモクが、-1m の左側面以外の3面でタマハハキモクが確認された。

表 3-16 (2) 動植物 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-3)

C-3	平均水面(m)	+1	±0	-1	-2	-3	-4
	位置 基質	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック	フロック
主要種※	上面	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	タマハハキモク カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	ワカメ カンザシゴカイ科	-
	右側面	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	ワカメ タマハハキモク フダラク ムラサキイガイ	カバノリ カンザシゴカイ科 キヒトデ	シダモク カバノリ カンザシゴカイ科 苔虫綱	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 苔虫綱 ホヤ綱(単体性)
	左側面	アラレタマキビ	イボニシ ムラサキイガイ	ワカメ フダラク	フダラク カンザシゴカイ科 キヒトデ	ワカメ カバノリ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	ワカメ シダモク カンザシゴカイ科 苔虫綱 ホヤ綱(群体性) ホヤ綱(単体性)
	裏面	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	タマハハキモク フダラク カンザシゴカイ科	フダラク カバノリ カンザシゴカイ科	ワカメ カバノリ カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 苔虫綱

※主要種: 上面については観察時の被度が10%以上または個体数が3個体以上の種を抽出
側面・裏面については現地写真により種の判別が可能な種を記述

注1) 緑の文字は植物を黒の文字は動物を示す。

図 3-9 (2) ブロック各位置の付着動植物の状況 (大阪沖埋立処分場 C-3)

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-17 に泉大津沖埋立処分場の 1 点 (D-2) におけるブロック各面の動植物の目視観察結果を示した。図 3-10 には、ブロック各位置の付着動植物の状況写真をまとめた。

・地点 D-2

ブロックの形状等により部分的に写真撮影や観察が困難な箇所があったが、+1m では巻貝のアラレタマキビが多く生息し、右側面ではイワフジツボの付着もみられた。±0m の左側面では紅藻のフダラクが生育し、各面ではコモレビコガモガイ、ウノアシ、イボニシ、カラマツガイ、キクノハナガイといった巻貝類やカンザシゴカイ科、Phoronis 属が生息していた。-1~-4m の多くの面では藻場構成種（大型褐藻）のワカメが繁茂しており、-5 m の各面では紅藻のタオヤギソウが多くみられた。その他、-1m 以深の各面では紅藻のカバノリやカンザシゴカイ科、Phoronis 属、苔虫綱、イトマキヒトデなどがよくみられた。

表 3-17 動植物 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

D-2	平均水面(m)	+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5
	位置 基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック
主要種※	上面	アラレタマキビ	ヨメガカサ コモレビコガモガイ ウノアシ イボニシ カラマツガイ イワフジツボ	アオサ属 ワカメ イボニシ	ワカメ ヒドロ虫綱 苔虫綱	ワカメ ムカデノリ カバノリ 尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 苔虫綱	ワカメ カバノリ タオヤギソウ カンザシゴカイ科 苔虫綱	カバノリ タオヤギソウ カンザシゴカイ科 苔虫綱
	右側面	アラレタマキビ イワフジツボ	カラマツガイ キクノハナガイ カンザシゴカイ科 Phoronis属	ワカメ フダラク カンザシゴカイ科 苔虫綱	ワカメ イソギンチャク目 カンザシゴカイ科 苔虫綱	ワカメ カンザシゴカイ科 苔虫綱	ワカメ	タオヤギソウ カンザシゴカイ科 苔虫綱
	左側面	アラレタマキビ	フダラク カンザシゴカイ科 Phoronis属	ワカメ カンザシゴカイ科 Phoronis属 ホヤ綱(群体性) ホヤ綱(単体性)	ワカメ イソギンチャク目 カンザシゴカイ科 苔虫綱 ホヤ綱(群体性)	ワカメ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	ワカメ	タオヤギソウ カンザシゴカイ科 苔虫綱
	裏面			イソギンチャク目 カンザシゴカイ科 Phoronis属	カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱 イトマキヒトデ	カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱 イトマキヒトデ	ワカメ カバノリ	ベニスナゴ タオヤギソウ カンザシゴカイ科 苔虫綱

※主要種: 上面については観察時の被度が 10%以上または個体数が 3 個体以上の種を抽出

側面・裏面については現地写真により種の判別が可能な種を記述

注 1) 緑の文字は植物を黒の文字は動物を示す。

平均水面 (m)	ブロック			
	上面	右側面	左側面	裏面
+1				
±0				
-1				
-2				
-3				
-4				
-5				

図 3-10 ブロック各位置の付着動植物の状況 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

3-4 遊泳魚類等調査

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-18 に神戸沖埋立処分場の 3 点 (A-2、A-4、A-5) における遊泳魚類等の目視観察結果を示した。図 3-11 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 A-2

A-2 の地点では、メバル、アイナメ、クロダイ、メジナ、コウイカの 5 種が目視観察によって確認された。

表 3-18 (1) 遊泳魚類 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-2)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名 基質	ケ-ソク	ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ	巨礫						
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~10)						r		r				
		アイナメ(20)						r		rr				
		クロダイ(40)				rr								
		メジナ(20)				rr								
		コウイカ(20)											rr	
出現種類数			0	0		2		2		2		1	0	

備考 1) ｲｶﾞｸﾞ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶﾞｸﾞ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 A-4

A-4 の地点では、メバル、カサゴ、アイナメ、クロダイ、メジナ、イシダイ、スズメダイ、コブダイ、キュウセン、ウマヅラハギの 10 種の遊泳魚類が目視観察で確認された。-6~-7m の水深帯での確認種が最も多かった。また、-2~-3m ではメジナが 11~50 個体 (c) と比較的多くみられた。

表 3-18 (2) 遊泳魚類 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-4)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名 基質	ﾌﾞｯｸ	ﾌﾞｯｸ 砂泥										
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~10)							r		r		r	
		カサゴ(5~20)				rr		rr		rr		rr		
		アイナメ(20)						rr		rr				
		クロダイ(40)				r		rr						
		メジナ(20)				c								
		イシダイ(30)									rr			
		スズメダイ(15)							r		rr			
		コブダイ(40)				rr					rr			
		キュウセン(10~20)									r			
		ウマヅラハギ(30)									rr			
出現種類数			0	0		4		5		8		2	0	

備考 1) ｲｶﾞｸﾞ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶﾞｸﾞ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 A-5

A-5 の地点では、メバル、カサゴ、アイナメ、キュウセンの4種の遊泳魚類が目視観察で確認された。

表 3-18 (3) 遊泳魚類 目視観察結果 (神戸沖埋立処分場 A-5)

調査日：平成30年6月2日

平均水面からの高さ (m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
門	綱	種名	基質													
			ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	大礫 小礫	大礫 小礫	大礫 小礫	大礫 小礫	大礫 小礫	大礫 小礫	大礫 巨礫	砂泥	
脊索動物	硬骨魚	メバル (3~10)									rr		r		r	
		カサゴ (5~10)							rr		rr		r		r	
		アイナメ (20)							rr							
		キュウセン (20)									rr					
出現種類数			0	0		0			2		3		2		2	

備考 1) イカ・タコ類 (頭足綱) 及び魚類 (硬骨魚綱) の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) イカ・タコ類及び魚類の種名欄における () 内の範囲は全長 (cm) を示す。

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-19 に大阪沖埋立処分場の 3 点 (C-1、C-2、C-3) における遊泳魚類等の目視観察結果を示した。図 3-11 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 C-1

C-1 の地点では、メバル、カサゴ、アイナメ、クロダイ、ウミタナゴ、コブダイ、ホシササノハベラ、キュウセン、コモンフグの 9 種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。-4~-5m の水深帯での確認種が多かった。-4~-5m ではメバルが 11~50 個体 (c) と比較的多くみられた。

表 3-19 (1) 遊泳魚類 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-1)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名 基質	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔
			脊索動物	硬骨魚	メバル(3~15)				r		c		r	
		カサゴ(10)										rr		
		アイナメ(20)						rr						
		クロダイ(40)						r						
		ウミタナゴ(10)						r						
		コブダイ(40)						rr						
		ホシササノハベラ(20)						rr		rr				
		キュウセン(20)						rr						
		コモンフグ(20)						rr						
出現種類数			0	0		1		8		2		1		0

備考 1) ｲｶ・ﾀﾞｲ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶ・ﾀﾞｲ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 C-2

C-2 の地点では、メバル、カサゴ、ウミタナゴ、スズメダイ、ホシササノハベラ、ウマヅラハギの 6 種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。-4~-5m の水深帯での確認種が多かった。-4~-5m ではメバルとスズメダイがそれぞれ 11~50 個体 (c) と比較的多く確認された。

表 3-19 (2) 遊泳魚類 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-2)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名 基質	ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔	巨磔
			脊索動物	硬骨魚	メバル(3~10)						c		r	
		カサゴ(5~10)						rr		rr				
		ウミタナゴ(10)						r						
		スズメダイ(10~15)						c		r				
		ホシササノハベラ(20)						rr						
		ウマヅラハギ(30)						rr						
出現種類数			0	0		0		6		3		1		0

備考 1) ｲｶ・ﾀﾞｲ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶ・ﾀﾞｲ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 C-3

C-3 の地点では、メバル、カサゴ、クロダイ、メジナ、イシダイ、スズメダイ、ホシササノハベラ、ウマヅラハギ、ヒガンフグの9種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。-2~-3mではメバル、-2~-7mではスズメダイが11~50個体(c)と比較的多くみられた。

表 3-19 (3) 遊泳魚類 目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 C-3)

調査日：平成30年6月3日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
門	綱	種名	基質											
			ブロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫						
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~5)					c		r		r		r	
		カサゴ(5~10)						rr						
		クロダイ(30)									rr			
		メジナ(20)							r					
		イシダイ(40)											rr	
		スズメダイ(10~15)					c		c		c			
		ホシササノハベラ(20)							rr		rr		rr	
		ウマヅラハギ(30)							rr					
		ヒガンフグ(25)									rr			
出現種類数			0	0		2		6		5		3	0	

備考1) ｲｶﾞﾀ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶﾞﾀ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-20 に泉大津沖埋立処分場の 4 点 (D-2、D-3、D-5、D-6) における遊泳魚類等の目視観察結果を示した。図 3-11 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場、泉大津沖埋立処分場における主な確認種の写真を示した。

・地点 D-2

D-2 の地点では、メバル、アイナメ、ボラ、ホシササノハベラの 5 種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。-2~-3m の水深帯で種類数が多かった。

表 3-20 (1) 遊泳魚類 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
門	綱	種名	基質															
			ブ'ロツク	転石	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	泥							
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~15)				r		r		r		rr		rr				
		アイナメ(20)				r		r										
		ボラ(60)				r												
		ホシササノハベラ(20)				r												
出現種類数			0	0		4		2		1		1		1			0	

備考 1) ｲｯｼﾞ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｯｼﾞ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 D-3

D-3 の地点では、メバル、アイナメ、クロダイ、キュウセン、ウマヅラハギの 5 種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。-6~-7m の水深帯での確認種が多かった。また、-6~-7m ではメバルが 51 個体以上 (cc) と極めて多くみられ、クロダイが 11~50 個体 (c) と比較的多くみられた。-8~-9m ではメバルが 11~50 個体 (c) と比較的多くみられた。

表 3-20 (2) 遊泳魚類 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-3)

調査日：平成30年5月26日

平均水面からの高さ(m)			+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
門	綱	種名	基質															
			ケ'ソツ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥								
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~15)				r		r		cc		c						
		アイナメ(20)								r		r						
		クロダイ(20~40)									c							
		キュウセン(10~15)									r							
		ウマヅラハギ(20~30)									r							
出現種類数			0	0		1		1		5		2		0			0	

備考 1) ｲｯｼﾞ類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は水深2m間隔での概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｯｼﾞ類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 D-5

D-5 の地点では、メバル、カサゴ、クロダイ、ウミタナゴ、スズメダイの5種の遊泳魚類が目視観察によって確認された。エコ岸壁周辺部における確認種が多かった。

表 3-20 (3) 遊泳魚類 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-5)

調査日：平成30年5月26日

			エコ岸壁		
			遊水室内	周辺	貫通孔
門	綱	種名 基質	ヶ-ソソ	ヶ-ソソ	ヶ-ソソ
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~20)	rr	r	
		カサゴ(20)	rr		
		クロダイ(30)		rr	
		ウミタナゴ(10)		r	
		スズメダイ(10~15)		r	
出現種類数			2	4	0

備考1) ｲｶﾞ如類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶﾞ如類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

・地点 D-6

D-6 の地点では、メバル、カサゴ、アイナメ、アナハゼ、クロダイ、ボラ科、ドロメの7種類が目視観察によって確認され、エコ岸壁周辺部と遊水室内における確認種が多かった。エコ岸壁周辺においてボラ科やハゼ科のドロメの稚仔魚が51個体以上(cc)と非常に多く観察された。

表 3-20 (4) 遊泳魚類 目視観察結果 (泉大津沖埋立処分場 D-6)

調査日：平成30年5月26日

			エコ岸壁		
			遊水室内	周辺	貫通孔
門	綱	種名 基質	ヶ-ソソ	ヶ-ソソ	ヶ-ソソ
脊索動物	硬骨魚	メバル(3~20)	r	rr	rr
		カサゴ(20)	rr		
		アイナメ(20)	rr	rr	
		アナハゼ(10)		rr	
		クロダイ(40)	r		
		ボラ科(3~5)		cc	
		ドロメ(2)		cc	
出現種類数			4	5	1

備考1) ｲｶﾞ如類(頭足綱)及び魚類(硬骨魚綱)の個体数は概数であり、各記号は下記個体数区分を示す。

rr:1~2個体, r:3~10個体, c:11~50個体, cc:51個体以上

2) ｲｶﾞ如類及び魚類の種名欄における()内の範囲は全長(cm)を示す。

メバル

カサゴ

アイナメ

クロダイ

イシダイ・スズメダイ

ホシササノハベラ

図 3-11 (1) 目視調査における主な遊泳魚類の確認種 (神戸沖・大阪沖・泉大津沖埋立処分場)

キュウセン

ウマヅラハギ

ヒガンフグ

コモンフグ

コウイカ

図 3-11 (2) 目視調査における主な遊泳魚類の確認種 (神戸沖・大阪沖・泉大津沖埋立処分場)

3-5 水質調査

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-21 に神戸沖埋立処分場 3 点 (A-2、A-4、A-5) における水質調査結果を示した。
図 3-12 には、水質の鉛直分布を示した。

・地点 A-2

A-2 の調査時 (平成 30 年 6 月 2 日 13:28) の天候は晴れ、作業船上での気温は 26.7℃、南西の風 3.7m/s で風浪階級は 3 と海況はやや波の高い状況であった。水色は dark green、透明度は 3.7m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 15.63~20.47℃の範囲にあり、水深 0.5~3m に水温躍層がみられた。

塩分は 23.41~32.34 の範囲にあり、水深 2m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量 (DO) は 1.45~11.95mg/L の範囲にあり、水深 5m 以深で 5 mg/L 以下とやや低い値を示したが、水深 5m 以深においても付着生物はみられた。また、水深 1m で 11.95 mg/L と非常に高い値を示しているが、この水深における植物プランクトンの発生に伴う光合成による溶存酸素量の上昇が考えられる。

相対光量は水深 3m 以深で急激に低下し、12m 以深で 1% 以下となっていた。

表 3-21 (1) 水質調査結果 (神戸沖埋立処分場 A-2)

調査日：平成 30 年 6 月 2 日

調査地点 A-2		調査時刻 13:28		天候 晴	気温 26.7℃
風向 SW		風速 3.7m/s		雲量 3	風浪階級 3
水深 15.9m		透明度 3.7m	水色 dark green		
水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量 (%)	DO (mg/L)
0	20.47	23.43	1828.4	100.0	7.59
0.5	20.44	23.41	1747.2	95.6	7.79
1	19.72	25.40	1045.7	57.2	11.95
2	18.47	29.45	574.2	31.4	5.94
3	17.37	30.69	376.0	20.6	5.68
4	17.03	30.93	217.1	11.9	5.12
5	16.99	31.01	146.3	8.0	4.80
6	16.64	31.28	108.4	5.9	4.32
7	16.26	31.92	71.3	3.9	3.51
8	16.06	32.02	61.8	3.4	3.30
9	16.01	32.10	42.3	2.3	3.08
10	16.01	32.17	32.7	1.8	3.45
11	16.04	32.27	22.0	1.2	2.94
12	15.94	32.30	16.1	0.9	2.36
13	15.77	32.24	11.2	0.6	2.02
14	15.76	32.34	7.9	0.4	1.92
15	15.63	32.31	5.8	0.3	1.45

・地点 A-4

A-4 の調査時（平成 30 年 6 月 2 日 11:06）の天候は晴れ、作業船上での気温は 24.4℃、南の風 3.6m/s で風浪階級は 3 と海況はやや波の高い状況であった。水色は dark green、透明度は 3.8m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 16.12～20.67℃の範囲にあり、水深 1～3m に水温躍層がみられた。

塩分は 21.72～32.42 の範囲にあり、水深 3m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量（DO）は 2.51～7.98mg/L の範囲にあり、水深 7m 以深で 5 mg/L 以下とやや低い値を示したが、水深 7m 以深においても付着生物はみられた。

相対光量は水深 3m 以深で急激に低下し、10m 以深で 1%以下となっていた。

表 3-21 (2) 水質調査結果 (神戸沖埋立処分場 A-4)

調査日：平成 30 年 6 月 2 日

調査地点 A-4		調査時刻 11:06		天候 晴	気温 24.4℃
風向 S		風速 3.6m/s		雲量 2	風浪階級 3
水深 15.5m		透明度 3.8m	水色 dark green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	20.67	21.72	2547.4	100.0	7.33
0.5	20.60	21.91	1309.0	51.4	7.33
1	20.34	22.53	1046.2	41.1	6.51
2	19.32	25.31	712.1	28.0	7.98
3	17.94	28.99	406.8	16.0	5.89
4	17.57	30.07	279.7	11.0	5.69
5	17.43	30.29	182.0	7.1	5.42
6	17.24	30.55	120.3	4.7	5.10
7	17.03	30.81	81.1	3.2	4.75
8	16.71	31.55	52.8	2.1	4.35
9	16.91	32.26	37.7	1.5	4.69
10	16.49	32.32	24.0	0.9	3.58
11	16.22	32.39	13.1	0.5	2.78
12	16.12	32.42	7.0	0.3	2.62
13	16.15	32.42	3.7	0.1	2.55
14	16.14	32.42	1.6	0.1	2.55
15	16.13	32.42	0.8	0.0	2.51

・地点 A-5

A-5の調査時(平成30年6月2日 9:30)の天候は晴れ、作業船上での気温は22.6℃、南の風2.8m/sで風浪階級は2と海況はやや波のある状況であった。水色はdark green、透明度は3.8mで赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は16.75~18.93℃の範囲にあり、顕著な水温躍層はみられなかった。

塩分は27.32~32.37の範囲にあり、水深6m以浅は30以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量(DO)は3.93~7.85mg/Lの範囲にあり、付着生物の生息する水深13m以浅では、ほぼ5mg/L以上であった。

相対光量は水深3m以深で急激に低下し、10m以深で1%以下となっていた。

表 3-21 (3) 水質調査結果 (神戸沖埋立処分場 A-5)

調査日：平成30年6月2日

調査地点 A-5		調査時刻 9:30		天候 晴	気温 22.6℃
風向 S		風速 2.8m/s		雲量 1	風浪階級 2
水深 16.6m		透明度 3.8m	水色 dark green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	18.88	27.32	2539.0	100.0	7.77
0.5	18.93	27.67	1417.6	55.8	7.73
1	18.86	27.68	996.9	39.3	7.82
2	18.78	27.79	602.8	23.7	7.85
3	18.73	28.08	370.1	14.6	7.73
4	18.56	28.37	232.9	9.2	7.67
5	18.61	28.42	154.0	6.1	7.55
6	18.50	28.64	101.0	4.0	7.33
7	17.16	31.75	67.1	2.6	4.71
8	17.03	32.18	46.3	1.8	5.10
9	17.09	32.23	31.2	1.2	5.28
10	17.05	32.24	22.9	0.9	5.31
11	17.06	32.28	17.3	0.7	5.23
12	17.06	32.27	12.6	0.5	5.07
13	17.01	32.28	9.0	0.4	5.00
14	16.99	32.36	6.3	0.2	4.98
15	16.92	32.37	4.1	0.2	4.83
16	16.75	32.37	2.2	0.1	3.93

図 3-12 (1) 水質の鉛直分布 (神戸沖埋立処分場 水温 塩分)

図 3-12 (2) 水質の鉛直分布 (神戸沖埋立処分場 DO 相对光量)

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-22 に大阪沖埋立処分場 3 点 (C-1、C-2、C-3) における水質調査結果を示した。
図 3-13 には、水質の鉛直分布を示した。

・地点 C-1

C-1 の調査時(平成 30 年 6 月 3 日 9:18)の天候は曇り、作業船上での気温は 26.6℃、西の風 2.0m/s で風浪階級は 3 と海況はやや波の高い状況であった。水色は dark green、透明度は 2.5m とやや低かったが、赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 16.32～20.27℃の範囲にあり、顕著な水温躍層はみられなかった。

塩分は 24.54～32.47 の範囲にあり、水深 3m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量 (DO) は 2.94～9.48mg/L の範囲にあり、水深 6m 以深で 5 mg/L 以下とやや低い値を示したが、水深 6m 以深においても付着生物はみられた。

相対光量は水深 2m 以深で急激に低下していた。

表 3-22 (1) 水質調査結果 (大阪沖埋立処分場 C-1)

調査日：平成 30 年 6 月 3 日

調査地点 C-1		調査時刻 9:18		天候 曇	気温 26.6℃
風向 W		風速 2.0m/s		雲量 7	風浪階級 3
水深 14.5m		透明度 2.5m	水色 dark green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	20.27	24.54	179.3	100.0	9.37
0.5	20.24	24.61	117.6	65.6	9.48
1	19.67	25.92	73.7	41.1	9.35
2	19.43	27.10	43.4	24.2	8.54
3	18.01	29.48	37.9	21.1	5.76
4	17.68	30.59	39.0	21.8	5.46
5	17.22	31.40	39.3	21.9	5.27
6	17.07	31.55	37.6	21.0	5.00
7	16.88	31.78	36.0	20.1	4.52
8	16.71	32.12	29.7	16.6	4.53
9	16.63	32.23	21.9	12.2	4.43
10	16.39	32.37	17.8	9.9	3.48
11	16.39	32.42	12.1	6.7	3.38
12	16.32	32.44	7.2	4.0	3.05
13	16.34	32.45	4.3	2.4	3.03
14	16.35	32.47	2.1	1.2	2.94

・地点 C-2

C-2 の調査時（平成 30 年 6 月 3 日 11:07）の天候は晴れ、作業船上での気温は 26.2℃、西の風 3.5m/s で風浪階級は 3 と海況はやや波の高い状況であった。水色は dark grayish green、透明度は 4.8m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 16.57～20.69℃の範囲にあり、顕著な水温躍層はみられなかった。

塩分は 25.92～32.46 の範囲にあり、水深 3m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量（DO）は 3.79～8.77mg/L の範囲にあり、水深 6m 以深で 5 mg/L 以下とやや低い値を示したが、水深 6m 以深においても付着生物はみられた。

相対光量は水深 4m 以深で急激に低下していた。

表 3-22 (2) 水質調査結果 (大阪沖埋立処分場 C-2)

調査日：平成 30 年 6 月 3 日

調査地点 C-2		調査時刻 11:07		天候 晴	気温 26.2℃
風向 W		風速 3.5m/s		雲量 5	風浪階級 3
水深 12.8m		透明度 4.8m	水色 dark grayish green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	20.69	25.92	1862.4	100.0	8.77
0.5	20.64	26.35	1311.8	70.4	8.64
1	20.49	26.81	1172.9	63.0	8.30
2	19.09	29.25	740.3	39.7	7.44
3	18.69	29.77	526.6	28.3	7.14
4	18.51	30.07	400.3	21.5	6.84
5	17.83	30.57	277.9	14.9	6.27
6	17.26	31.57	209.7	11.3	4.88
7	16.90	32.10	160.2	8.6	4.60
8	16.82	32.19	128.2	6.9	4.47
9	16.78	32.24	99.6	5.3	4.46
10	16.64	32.37	78.3	4.2	3.90
11	16.58	32.46	39.0	2.1	3.83
12	16.57	32.46	27.9	1.5	3.79

・地点 C-3

C-3 の調査時（平成 30 年 6 月 3 日 13 : 35）の天候は曇り、作業船上での気温は 25.7℃、南西の風 5.3m/s で風浪階級は 3 と海況はやや波の高い状況であった。水色は dark grayish green、透明度は 2.1m とやや低かったが、赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 16.63～22.23℃の範囲にあり、水深 2～3m に水温躍層がみられた。

塩分は 25.88～32.49 の範囲にあり、水深 4m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量（DO）は 3.81～11.41mg/L の範囲にあり、付着生物の生息する水深 11m 以浅でほぼ 5 mg/L 以上であった。

相対光量は水深 2m 以深で急激に低下していた。

表 3-22 (3) 水質調査結果 (大阪沖埋立処分場 C-3)

調査日：平成 30 年 6 月 3 日

調査地点 C-3		調査時刻 13 : 35		天候 曇	気温 25.7℃
風向 SW		風速 5.3m/s		雲量 7	風浪階級 3
水深 14.1m		透明度 2.1m	水色 dark grayish green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	22.23	25.88	388.9	100.0	11.40
0.5	22.21	25.89	283.6	72.9	11.41
1	22.19	25.89	148.9	38.3	11.38
2	22.13	25.94	70.2	18.1	11.35
3	19.17	29.12	66.7	17.2	7.56
4	18.92	29.43	77.2	19.9	7.43
5	18.21	30.44	79.7	20.5	5.69
6	17.57	31.35	74.1	19.1	6.26
7	17.06	31.73	60.0	15.4	4.84
8	16.92	32.24	49.1	12.6	5.09
9	16.86	32.30	35.5	9.1	5.03
10	17.04	32.37	30.9	7.9	5.52
11	17.02	32.44	24.6	6.3	5.73
12	16.67	32.48	15.2	3.9	4.07
13	16.64	32.49	6.5	1.7	3.90
14	16.63	32.48	4.5	1.2	3.81

図 3-13 (1) 水質の鉛直分布 (大阪沖埋立処分場 水温 塩分)

図 3-13 (2) 水質の鉛直分布 (大阪沖埋立処分場 DO 相对光量)

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 3-23 に泉大津沖埋立処分場 3 点 (D-2、D-5、D-6) における水質調査結果を示した。図 3-14 には、水質の鉛直分布を示した。

・地点 D-2

D-2 の調査時 (平成 30 年 5 月 26 日 8:34) の天候は曇り、作業船上での気温は 22.1℃、西の風 1.1m/s で風浪階級は 2 と海況はやや波のある状況であった。水色は forest green、透明度は 4.0m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 15.59~21.09℃の範囲にあり、顕著な水温躍層はみられなかった。

塩分は 28.47~32.10 の範囲にあり、水深 2m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量 (DO) は 2.85~10.94mg/L の範囲にあり、水深 9m 以深で 5 mg/L 以下とやや低い値を示したが、水深 9m 以深においても付着生物はみられた。

相対光量は水深 3m 以深で急激に低下していた。

表 3-23 (1) 水質調査結果 (泉大津沖埋立処分場 D-2)

調査日：平成 30 年 5 月 26 日

調査地点 D-2		調査時刻 8:34		天候 曇	気温 22.1℃
風向 W		風速 1.1m/s		雲量 9	風浪階級 2
水深 12.5m		透明度 4.0m	水色 forest green		
水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量 (%)	DO (mg/L)
0	21.09	28.47	367.6	100.0	10.94
0.5	20.59	29.20	308.9	84.0	9.06
1	20.33	29.38	161.7	44.0	8.77
2	20.02	29.48	120.8	32.9	8.64
3	19.24	30.12	83.7	22.8	7.87
4	17.75	30.99	69.3	18.9	6.92
5	17.25	31.32	61.1	16.6	7.14
6	16.76	31.66	53.7	14.6	6.54
7	16.20	32.02	40.7	11.1	6.06
8	16.14	32.04	29.6	8.1	5.80
9	15.91	32.04	24.6	6.7	4.35
10	15.72	32.08	18.3	5.0	3.57
11	15.63	32.08	12.7	3.5	3.23
12	15.59	32.10	8.7	2.4	2.85

・地点 D-5

D-5 の調査時（平成 30 年 5 月 26 日 10:27）の天候は曇り、作業船上での気温は 21.6℃、北の風 1.6m/s で風浪階級は 1 と海況は穏やかな状況であった。水色は dark green、透明度は 3.1m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 15.63～21.20℃の範囲にあり、水深 1～3m に水温躍層がみられた。

塩分は 22.76～32.02 の範囲にあり、水深 2m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量（DO）は 2.23～8.83mg/L の範囲にあり、水深 8m 以深で 5 mg/L 以下となっていた。

相対光量は水深 2m 以深で急激に低下していた。

表 3-23 (2) 水質調査結果 (泉大津沖埋立処分場 D-5)

調査日：平成 30 年 5 月 26 日

調査地点 D-5		調査時刻 10:27		天候 曇	気温 21.6℃
風向 N		風速 1.6m/s		雲量 10	風浪階級 1
水深 11.5m		透明度 3.1m	水色 dark green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(-)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	20.99	22.76	693.5	100.0	5.95
0.5	21.19	28.41	355.7	51.3	7.81
1	21.20	28.17	223.1	32.2	8.83
2	19.97	29.54	145.3	21.0	7.29
3	18.30	30.76	139.4	20.1	6.66
4	17.53	31.32	93.3	13.5	6.66
5	17.21	31.46	67.1	9.7	6.42
6	16.95	31.61	50.1	7.2	6.38
7	16.34	31.75	40.3	5.8	5.07
8	16.03	31.98	25.5	3.7	3.80
9	15.80	31.99	14.6	4.0	3.04
10	15.68	32.02	9.8	2.7	2.42
11	15.63	32.02	5.0	1.4	2.23

• 地点 D-6

D-6 の調査時（平成 30 年 5 月 26 日 11:15）の天候は曇り、作業船上での気温は 22.4℃、西南西の風 2.1m/s で風浪階級は 2 と海況はやや波のある状況であった。水色は dark green、透明度は 3.5m で赤潮や工事等による汚濁の状況はみられなかった。

水温は 16.04～20.38℃の範囲にあり、水深 1～3m に水温躍層がみられた。

塩分は 29.14～31.85 の範囲にあり、水深 1m 以浅は 30 以下と、河川水等の影響がみられた。

溶存酸素量（DO）は 4.83～8.51mg/L の範囲にあり、水深 8m 以浅で 5 mg/L 以上となっていた。

相対光量は水深 3m 以深で急激に低下していた。

表 3-23 (3) 水質調査結果 (泉大津沖埋立処分場 D-6)

調査日：平成 30 年 5 月 26 日

調査地点 D-6		調査時刻 11:15		天候 曇	気温 22.4℃
風向 WSW		風速 2.1m/s		雲量 10	風浪階級 2
水深 9.5m		透明度 3.5m	水色 dark green		
水深(m)	水温(℃)	塩分(—)	光量子 ($\mu\text{mol}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$)	相対光量(%)	DO(mg/L)
0	20.38	29.14	451.7	100.0	8.46
0.5	20.36	29.21	309.2	68.5	8.46
1	20.25	29.27	223.2	49.4	8.51
2	19.33	30.01	115.1	25.5	7.71
3	17.80	30.87	88.5	19.6	6.05
4	17.13	31.23	72.0	15.9	5.61
5	16.88	31.45	53.5	11.8	5.91
6	16.56	31.61	40.0	8.9	5.68
7	16.54	31.70	29.0	6.4	5.16
8	16.15	31.84	19.5	4.3	5.14
9	16.04	31.85	15.8	3.5	4.83

図 3-14 (1) 水質の鉛直分布 (泉大津沖埋立処分場 水温 塩分)

図 3-14 (2) 水質の鉛直分布 (泉大津沖埋立処分場 DO 相対光量)

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-25 に大阪沖埋立処分場周囲の代表地点 6 点 (p. 12 図 2-3 (2) 参照) における藻場構成種等 (植物) の目視観察結果を示した。図 3-15 には、神戸沖埋立処分場、大阪沖埋立処分場における主な藻場構成種の写真を示した。

代表地点では 7~10 種の海藻類がみられ、藻場構成種となる大型褐藻として、ワカメ (6 地点)、シダモク (6 地点)、タマハハキモク (5 地点) の 3 種が確認された。確認地点でのワカメの被度は 5%未満~75%、シダモクは 5%未満~50%、タマハハキモクは 5%未満~25%であった。

表 3-25 藻場構成種等の目視観察結果 (大阪沖埋立処分場 6 地点)

調査日：平成30年6月3日

調査地点		C-4										O-1										O-3												
出現種	水深(m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
緑藻綱	アオサ属	2			1	1							1			1	1							2	1			1						
褐藻綱	ワカメ	1	2	2	2	2	2	1	1			2	4	3	2	3	1							2	2	2	1	1	1	1	1			
	シダモク	3	2	2	3										2													1						
	タマハハキモク	1	2	1												1	1														1			
紅藻綱	マクサ					1										1												1	1					
	ススカケハニ					1										1												1						
	フカヅク	3	3	2			2									1	1	1	1								1	2	2	1	1	1	1	1
	ツルツル		1	1																								1						
	ヘニスタゴ		1	1	1	2										1	1	1	2									2	2	2	1	1	1	1
	カハノリ			3	4	2		1	1				1	2	2	4	1	1	1	1					1	1	2	3	1	1	1	1	1	1

調査地点		O-6										O-7										O-13													
出現種	水深(m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
緑藻綱	アオサ属	2	1	2									1		1									1	1	1	1								
褐藻綱	ワカメ	2	4	3	3	2	2	1	1			1	4	3	3	3	3	1	1					2	2	3	3	2		1	1				
	シダモク						1							1												1	2	1	2						
	タマハハキモク													1	1											1	2								
紅藻綱	マクサ																		1															1	
	ススカケハニ																		1																
	フカヅク					1	2							1	1	2	3	1						2	2	1		1	1						
	ツルツル	2		2								2	2	2	2									3											
	ヘニスタゴ					1	2							1	1	2	3	1										1	1						
	カハノリ			1	1		1	1					1			1	2	1	1							2	2	1							

(被度区分)
 5 : 76~100%
 4 : 51~75%
 3 : 26~50%
 2 : 5~25%
 1 : 5%未満

ワカメ

シダモク

アカモク

タマハキモク

図 3-15 代表的な藻場構成種の状況（神戸沖・大阪沖埋立処分場）

3-6-2 代表地点における定量採取結果

(1) 神戸沖埋立処分場

表 3-26 に神戸沖埋立処分場周囲の代表地点 6 点 (p. 11 図 2-3 (1) 参照) において坪刈り採取した藻場構成種等 (植物) の分析結果 (種別湿重量) を示した。

6 地点全体で 27 種の海藻類が確認され、各地点では 8~18 種が出現した。

藻場構成種となる大型褐藻として、ワカメ (4 地点)、シダモク (5 地点)、アカモク (1 地点) の 3 種が確認され、ワカメの湿重量は 0.21~409.84g/0.25 m²、シダモクの湿重量は 13.63~291.98g /0.25 m²、アカモクは 24.44g/0.25 m²であった。

藻場構成種以外では、マクサ、ムカデノリ、ベニスナゴ、カバノリなどの紅藻の湿重量が多くなっていた (図 3-16 参照)。

表 3-26 定量採取分析結果 神戸沖埋立処分場 代表地点 6 点 海藻類湿重量

No.	門	綱	目	科	種名 / 項目	調査地点 神戸沖					
						A-1	A-3	K-2	K-4	K-5	K-8
						湿重量	湿重量	湿重量	湿重量	湿重量	湿重量
1	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	Enteromorpha sp.						
2	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	Ulva sp.	0.06	0.50	0.04	0.09	1.11	0.59
3	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Chaetomorpha sp.				+		
4	緑色植物	緑藻	シオグサ	シオグサ	Cladophora sp.	+				+	0.01
5	黄色植物	褐藻	シオミドロ	シオミドロ	Ectocarpus sp.				+		
6	黄色植物	褐藻	カモリ	カモリ	Colpomenia sinuosa		0.28		0.03	0.22	0.04
7	黄色植物	褐藻	コンブ	ホウライ	Undaria pinnatifida		206.75	185.57	0.21		409.84
8	黄色植物	褐藻	ヒバマタ	ホウライ	Sargassum filicinum	13.63	158.07		291.98	250.01	104.39
9	黄色植物	褐藻	ヒバマタ	ホウライ	Sargassum horneri				24.44		
10	黄色植物	褐藻	ヒバマタ	ホウライ	Sargassum muticum						
11	紅色植物	紅藻	サゴモ	サゴモ	Amphiroa sp.						
12	紅色植物	紅藻	サゴモ	サゴモ	Corallina pilulifera						
13	紅色植物	紅藻	サゴモ	サゴモ	Corallinaceae	*		*	*	*	
14	紅色植物	紅藻	テングサ	テングサ	Gelidium elegans	3.06	4.39	+		5.01	1.56
15	紅色植物	紅藻	スキリ	スサケハニ	Halarachnion latissimum						
16	紅色植物	紅藻	スキリ	スキリ	Chondrus giganteus						
17	紅色植物	紅藻	スキリ	スキリ	Chondrus ocellatus						
18	紅色植物	紅藻	スキリ	スキリ	Chondrus sp.	0.16					
19	紅色植物	紅藻	スキリ	ムカデノリ	Grateloupia filicina	32.65	10.77			3.49	3.70
20	紅色植物	紅藻	スキリ	ムカデノリ	Grateloupia lanceolata		0.07			0.06	0.29
21	紅色植物	紅藻	スキリ	ムカデノリ	Grateloupia turuturu		+				
22	紅色植物	紅藻	スキリ	ムカデノリ	Grateloupia sp.						
23	紅色植物	紅藻	スキリ	イハラリ	Hypnea asiatica						0.04
24	紅色植物	紅藻	スキリ	ツカサリ	Callophyllis japonica						
25	紅色植物	紅藻	スキリ	オキツリ	Ahnfeltiopsis flabelliformis		0.94			0.67	
26	紅色植物	紅藻	スキリ	ベニスナゴ	Schizymenia dubyi					196.57	
27	紅色植物	紅藻	オコノリ	オコノリ	Gracilaria textorii	30.76	4.29	0.02		66.05	23.94
28	紅色植物	紅藻	マゴシバリ	マゴシバリ	Chrysmenia wrightii	16.33				2.60	
29	紅色植物	紅藻	マゴシバリ	マゴシバリ	Rhodomenia intricata	+			+	6.98	
30	紅色植物	紅藻	イサ	イサ	Antithamnion sp.	0.09	+	0.01			0.02
31	紅色植物	紅藻	イサ	イサ	Ceramium sp.		+	+	+	+	
32	紅色植物	紅藻	イサ	イサ	Ceramiales	0.04	+	0.01	+	+	0.01
33	紅色植物	紅藻	イサ	ランゲリア	Plumariella yoshikawae						
34	紅色植物	紅藻	イサ	ダシア	Dasys sessilis						
35	紅色植物	紅藻	イサ	ダシア	Dasysiphonia japonica					0.41	
36	紅色植物	紅藻	イサ	フシマツモ	Polysiphonia sp.					+	0.01
37	紅色植物	紅藻	イサ	フシマツモ	Pterosiphonia sp.						
38	紅色植物	紅藻	イサ	フシマツモ	Symphocladia marchantioides					2.38	
種類数						13	13	8	11	18	13
湿重量 (g) 合計						106.37	386.06	185.65	316.75	535.56	544.40

注1: 単位は湿重量 (g)/0.25m²を示す。

注2: *は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

マクサ

カバノリ

図 3-16 藻場構成種以外の主な海藻類 (神戸沖埋立処分場)

(2) 大阪沖埋立処分場

表 3-27 に大阪沖埋立処分場周囲の代表地点 6 点 (p. 12 図 2-3 (2) 参照) において採刈り採取した藻場構成種等 (植物) の分析結果 (種別湿重量) を示した。

6 地点全体で 30 種の海藻類が確認され、各地点では 13~21 種が出現した。

藻場構成種となる大型褐藻として、ワカメ (6 地点)、シダモク (5 地点)、タマハハキモク (1 地点) の 3 種が確認され、ワカメの湿重量は 22.84~355.81 g/0.25 m²、シダモクは 5.35~320.68g/0.25 m²、タマハハキモクは 79.16g/0.25 m²であった。

藻場構成種以外では、フダラク、ベニスナゴ、カバノリなどの紅藻の湿重量が多くなっていた (図 3-17 参照)。

表 3-27 定量採取分析結果 大阪沖埋立処分場 代表地点 6 点 海藻類湿重量

No.	門	綱	目	科	種名 / 項目	調査地点 大阪沖						
						標番号	C-4	0-1	0-3	0-6	0-7	0-13
						湿重量	湿重量	湿重量	湿重量	湿重量	湿重量	
1	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Enteromorpha sp.	アサ	0.01					+
2	緑色植物	緑藻	アサ	アサ	Ulva sp.	アサ	0.76	0.89	0.46	+	+	0.95
3	緑色植物	緑藻	シダモク	シダモク	Chaetomorpha sp.	シダモク						
4	緑色植物	緑藻	シダモク	シダモク	Cladophora sp.	シダモク	+			0.11	0.01	0.08
5	黄色植物	褐藻	シオミドロ	シオミドロ	Ectocarpus sp.	シオミドロ						
6	黄色植物	褐藻	ワカメ	ワカメ	Colpomenia sinuosa	ワカメ	0.29				1.34	9.26
7	黄色植物	褐藻	ワカメ	ワカメ	Undaria pinnatifida	ワカメ	105.92	301.35	36.32	355.81	196.73	22.84
8	黄色植物	褐藻	ワカメ	ワカメ	Sargassum filicinum	ワカメ	161.64	320.68	6.48		5.35	80.93
9	黄色植物	褐藻	ワカメ	ワカメ	Sargassum horneri	ワカメ						
10	黄色植物	褐藻	ワカメ	ワカメ	Sargassum muticum	ワカメ			79.16			
11	紅色植物	紅藻	カバノリ	カバノリ	Amphiroa sp.	カバノリ	0.01					0.01
12	紅色植物	紅藻	カバノリ	カバノリ	Corallina pilulifera	カバノリ	0.08					15.19
13	紅色植物	紅藻	カバノリ	カバノリ	Corallinaceae	カバノリ					*	
14	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Gelidium elegans	シダモク	0.65	1.02	0.41			
15	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Halarachnion latissimum	シダモク	11.73					
16	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Chondrus giganteus	シダモク	5.18		0.55			8.34
17	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Chondrus ocellatus	シダモク	1.95		1.31		0.21	45.30
18	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Chondrus sp.	シダモク		0.03		0.27		0.05
19	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Grateloupia filicina	シダモク	0.03	0.63	4.98	0.08		
20	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Grateloupia lanceolata	シダモク	99.63	0.40	10.86	35.20	8.36	21.48
21	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Grateloupia turuturu	シダモク	4.99	+		5.63	0.19	0.02
22	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Grateloupia sp.	シダモク						
23	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Hypnea asiatica	シダモク		+				0.01
24	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Callophyllis japonica	シダモク						0.01
25	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Ahnfeltiopsis flabelliformis	シダモク	2.46		0.11		0.24	0.14
26	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Schizymenia dubyi	シダモク	13.18	2.33	35.85	1.22	96.13	
27	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Gracilaria textorii	シダモク	100.86	37.71	28.81	20.23	0.10	8.71
28	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Chrysmenia wrightii	シダモク						
29	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Rhodymenia intricata	シダモク		0.21	0.40	0.32		0.77
30	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Antithamnion sp.	シダモク	+	0.01		1.51	0.34	
31	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Ceramium sp.	シダモク	0.03	+		0.32	0.09	+
32	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Ceramiales	シダモク	+		+	0.02		+
33	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Plumariella yoshikawae	シダモク			0.03			
34	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Dasysiphonia sessilis	シダモク						
35	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Dasysiphonia japonica	シダモク						
36	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Polysiphonia sp.	シダモク					+	
37	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Pterosiphonia sp.	シダモク						0.03
38	紅色植物	紅藻	シダモク	シダモク	Symphocladia marchantioides	シダモク						
種類数							21	14	16	13	15	21
湿重量 (g) 合計							509.40	665.26	205.73	420.72	309.09	214.12

注1: 単位は湿重量 (g)/0.25m²を示す。
注2: *は湿重量計測困難な種の出現を、+は湿重量が0.01g未満の出現を示す。

フダラク

ベニスナゴ

図 3-17 藻場構成種以外の主な海藻類 (大阪沖埋立処分場)

3-6-3 藻場分布状況

(1) 神戸沖埋立処分場

神戸沖埋立処分場周囲護岸における藻場構成種および主要な海藻類の分布状況を過年度の結果と併せて図 3-18～30 に示した。

【藻場構成種（大型褐藻）】

藻場構成種として、前回調査（平成 28 年度）までに確認されている種を含め、ワカメ、カジメ、シダモク、タマハハキモク、ヒジキ、ヨレモクモドキ、アカモクの 6 種について分布図を作成した。なお、今回の調査では、カジメ、ヒジキの分布は確認されなかった。

① ワカメ（図 3-18）

ワカメは、平成 21～22 年度および平成 24 年度に南護岸の-3～-5m 付近で分布が確認された。平成 26 年度では南護岸の広い範囲と東護岸の一部の±0～-5m で分布が確認され、濃密域がみられるなど分布範囲と被度の増加がみられた。平成 28 年も同様に南護岸の広い範囲と東護岸の一部の±0～-4m で分布が確認されたが、被度は濃密域がみられるほどではなかった。今回の調査では、南護岸、東護岸に加え、西護岸の広い範囲で分布が確認され、南護岸の広い範囲と東護岸の一部では濃密域がみられるなど過去最大の分布範囲と被度を記録した。

② カジメ（図 3-19）

カジメは、平成 21 年度に南護岸の 1 箇所で分布が確認されたが、平成 22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度、平成 28 年度および今回の調査では分布が確認されなかった。

③ シダモク（図 3-20）

シダモクは、平成 21～22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度および平成 28 年度に各護岸の-2～-6m 付近で分布が確認されたが、平成 24 年度から平成 28 年度にかけて分布範囲の減少傾向がみられた。今回の調査では、各護岸の-1～-10m で分布が確認され、西護岸と東護岸では分布範囲の拡大がみられ、東護岸では濃密域を形成するなど被度の増加も確認された。

④ タマハハキモク（図 3-21）

タマハハキモクは、平成 21～22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度および平成 28 年度に各護岸の±0～-5m 付近で分布が確認された。今回の調査でも同様に各護岸の±0～-10m で分布が確認され、特に西護岸では分布範囲の拡大と同時に一部、濃密域を形成するなど、被度の増加も認められた。

⑤ ヒジキ (図 3-22)

ヒジキは、平成 21～22 年度に西護岸の 1 箇所を確認されたが、平成 24 年度、平成 26 年度、平成 28 年度および今回の調査では分布が確認されなかった。

⑥ ヨレモクモドキ (図 3-23)

ヨレモクモドキは平成 22 年度に南護岸と東護岸の各 1 箇所、平成 24 年度に南護岸の 1 箇所、平成 26 年度に南護岸の 2 箇所、平成 28 年度に西護岸の 1 箇所、南護岸の 4 箇所、東護岸の 1 箇所分布が確認された。今回の調査では、西護岸の 2 箇所、東護岸の 1 箇所分布が確認された。

⑦ アカモク (図 3-24)

アカモクは平成 26 年度までの調査では確認されていなかったが、今回の調査では、西護岸の 1 箇所分布が確認された。

[平成28年春季]

タマハハキモク分布状況

[平成30年春季]

タマハハキモク分布状況

図 3-21 (3) 分布状況の推移 (タマハハキモク) 神戸沖 平成 28~30 年度調査

[平成28年春季]

被覆ブロック					消波ブロック					
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

[平成30年春季]

被覆ブロック					消波ブロック					
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

図 3-22 (3) 分布状況の推移 (ヒジキ) 神戸沖 平成 28~30 年度調査

[平成28年春季]

ヨレモクモドキ分布状況

[平成30年春季]

ヨレモクモドキ分布状況

図 3-23 (3) 分布状況の推移 (ヨレモクモドキ) 神戸沖 平成 28~30 年度調査

【その他 主要な海藻】

藻場構成種を除く主要な海藻として、前回調査（平成 28 年度）までに確認されている種を含め、アオサ属、マクサ、ススカケベニ、フダラク、ベニスナゴ、カバノリ、ツルツルの 7 種について分布図を作成した。なお、今回の調査では、ツルツルの分布は確認されなかった。

① アオサ属（図 3-25）

アオサ属は、平成 21～22 年度および平成 24 年度に各護岸の±0～-7m 付近に広く分布が確認されたが、平成 22 年度は平成 21 年度と比較して東護岸で分布範囲の減少がみられた。平成 26 年度には広く分布が確認されたが、各護岸で被度の減少がみられた。平成 28 年度には広く分布が確認され、平成 26 年度に比べて、南護岸を中心に被度の増加がみられた。今回の調査でも、各護岸の±0～-10m の広い範囲で分布が確認されたが、平成 28 年度に比べて、被度の減少がみられた。

② マクサ（図 3-26）

マクサは、平成 21～22 年度に南護岸、東護岸の-2～-6m 付近で広く分布が確認され、西護岸においても 2 箇所分布が確認された。平成 24 年度は前回までの調査でほとんど分布が確認されなかった西護岸を含む、各護岸の-1～-8m 付近で広く分布しており、平成 26 年度の調査でも、各護岸で広く分布が確認され、西護岸と南護岸では分布範囲が拡大していた。平成 28 年度の調査でも、同様に各護岸で広く分布が確認され、南護岸と東護岸では分布の拡大傾向がみられたが、西護岸では北側の一部に分布が縮小していた。今回の調査でも各護岸で広く分布が確認され、平成 28 年度に比べて、南護岸では分布の縮小が、西護岸では分布の拡大が認められた。

③ ススカケベニ（図 3-27）

ススカケベニは、平成 21～22 年度および平成 24 年度に、各護岸の-2～-10m 付近で広く分布が確認された。平成 26 年度の調査では、西護岸、東護岸の-3～-10m 付近で分布が確認されたが、南護岸では分布がみられず、東護岸の分布範囲は前回までと比較して減少していた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-4～-5m で分布が確認されたが、西護岸と東護岸では分布域の縮小がみられ、平成 26 年度に確認されなかった南護岸では 4 か所で分布が確認された。今回の調査では、西護岸と南護岸の-4～-9m に分布が確認され、平成 28 年度と同様の分布傾向を示したが、東護岸では分布が確認されなかった。

④ フダラク (図 3-28)

フダラクは、平成 21～22 年度に各護岸の±0～-4m 付近で広く分布が確認された。平成 24 年度にも各護岸で分布が確認されたが、西護岸では分布範囲の減少がみられた。平成 26 年度の調査では、平成 24 年度で分布範囲の減少がみられた西護岸で分布範囲が増加し、各護岸で広く分布が確認された。平成 28 年度の調査では、各護岸で分布が確認されたが、各護岸で分布範囲の減少がみられた。今回の調査では、南護岸と東護岸では分布範囲の回復傾向が認められたが、西護岸では分布が確認されなかった。

⑤ ベニスナゴ (図 3-29)

ベニスナゴは、平成 21～22 年度に各護岸の-1～-9m 付近で広く分布が確認された。平成 24 年度にも各護岸で分布が確認されたが、東護岸で分布範囲の減少、西護岸で分布範囲の増加がみられた。平成 26 年度の調査でも、被度の減少はみられたが、平成 24 年度の調査と同様に各護岸の-1～-7m で広く分布が確認された。平成 28 年度の調査では、南護岸の 1 箇所で確認されたのみで、分布範囲が大きく減少していた。今回の調査では、各護岸の-1～-10m の広い範囲で分布が確認され、平成 26 年度以前への分布範囲および被度の回復傾向が認められた。

⑥ カバノリ (図 3-30)

カバノリは、平成 21 年度には分布が確認されなかったが、平成 22 年度、平成 24 年度に各護岸の-2～-8m 付近で分布が確認された。平成 24 年度は平成 22 年度と比較して分布範囲の増加がみられた。平成 26 年度の調査では、各護岸の-1～-6m 付近で分布が確認されたが、平成 24 年度と比較して東護岸で分布範囲の減少がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-1～-10m 付近で分布が確認され、平成 26 年度と比べると、東護岸では分布範囲の拡大を、西護岸では分布範囲の縮小を確認した。今回の調査でも、各護岸の-1～-10m 付近の広い範囲で分布が確認され、平成 28 年度に比べて、西護岸と東護岸では分布範囲が拡大し、また、全体的に被度の増大が認められた。

⑦ ツルツル (図 3-31)

ツルツルは平成 21～22 年度には分布が確認されなかったが、平成 24 年度に、各護岸の-1～-6m 付近で分布が確認された。平成 26 年度の調査では、東護岸と西護岸で分布が確認されたが、平成 24 年度と比較して分布範囲と被度の減少がみられた。平成 28 年度の調査では分布が確認されなかった。今回の調査では各護岸の±0～-2m 付近の広い範囲で分布が確認された。

[平成28年春季]

[平成30年春季]

図 3-26 (3) 分布状況の推移 (マクサ) 神戸沖 平成 28~30 年度調査

[平成28年春季]

ススカケベニ分布状況

[平成30年春季]

ススカケベニ分布状況

図 3-27 (3) 分布状況の推移 (ススカケベニ) 神戸沖 平成 28~30 年度調査

(2) 大阪沖埋立処分場

大阪沖埋立処分場周囲護岸における藻場構成種および主要な海藻類の分布状況を過年度の結果と併せて図 3-31～43 に示した。

【藻場構成種（大型褐藻）】

藻場構成種として、前回調査（平成 28 年度）までに確認されている種を含め、ワカメ、カジメ、シダモク、アカモク、タマハハキモク、ヨレモクモドキの 6 種について分布図を作成した。なお、今回の調査では、カジメ、ヨレモクモドキの分布は確認されなかった。

① ワカメ（図 3-32）

ワカメは、平成 21 年度には分布が確認されなかったが、平成 22 年度は北護岸と西護岸の各 1 箇所、平成 24 年度は各護岸の-2～-6m 付近で分布が確認された。平成 26 年度の調査では、各護岸の±0～-6m 付近で分布が確認され、平成 24 年度と比較して分布範囲の増加がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-1～-6m 付近で分布が確認され、平成 26 年度の調査よりもさらに分布範囲が拡大し、被度も増加していた。今回の調査では、各護岸の±0～-8 m 付近で分布が確認され、平成 28 年度の調査よりも水深方向での分布範囲が拡大していた。

② カジメ（図 3-33）

カジメは、平成 21 年度は分布が確認されなかったが、平成 22 年度は南護岸で 1 箇所、平成 24 年度は南護岸、西護岸の各 2 箇所、平成 26 年度、平成 28 年度および今回の調査では分布が確認されなかった。

③ シダモク（図 3-34）

シダモクは、平成 21～22 年度および平成 24 年度に各護岸の-1～-6m 付近で広く分布が確認されたが、平成 24 年度にかけて分布範囲が減少傾向にあった。平成 26 年度の調査では、-2～-6m 付近で広く分布が確認され、平成 24 年度と比較して西護岸、南護岸で分布範囲の増加がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-1～-7m 付近で広く分布が確認され、過年度に比べて被度的にも増加傾向を示した。今回の調査でも、各護岸の-1～-7m 付近で広く分布が確認され、平成 28 年度と比べて、北護岸では分布範囲の拡大を、南護岸では分布範囲の縮小を確認した。

④ アカモク（図 3-35）

アカモクは、平成 21 年度は北護岸と西護岸、平成 22、24 年度は南護岸と西護岸の-2～-5m 付近に分布が確認されたが、平成 26 年度の調査では分布が確認されなかった。平成 28 年度の調査では、北護岸と南護岸の-3～-6m 付近で確認された。今回の調査では分布が確認されなかった。

⑤ タマハハキモク (図 3-36)

タマハハキモクは、平成 21～22 年度および平成 24 年度に各護岸の-1～-5m 付近で分布が確認されたが、平成 24 年度にかけて分布範囲は減少傾向にあった。平成 26 年度の調査では、平成 24 年度と比較して北護岸、南護岸で分布範囲、北護岸では被度の増加がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-1～-4m 付近で分布が確認され、平成 26 年度調査時と大きな変化はみられなかった。今回の調査でも、各護岸の±0～-6m 付近で分布が確認され、平成 26 年度、28 年度と同様の分布傾向を示した。

⑥ ヨレモクモドキ (図 3-37)

ヨレモクモドキは平成 22 年度に南護岸で 1 箇所分布が確認されたのみであり、今回の調査でも分布が確認されなかった。

[平成 21 年春季]

ワカメ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

[平成 22 年春季]

ワカメ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

図 3-32 (1) 分布状況の推移 (ワカメ) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成28年春季]

ワカメ分布状況
 被度区分 : 5%未満
 : 5~25%
 : 26~50%
 : 51~75%
 : 76~100%

[平成30年春季]

ワカメ分布状況
 被度区分 : 5%未満
 : 5~25%
 : 26~50%
 : 51~75%
 : 76~100%

図 3-32 (3) 分布状況の推移 (ワカメ) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成24年春季]

カジメ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

[平成26年春季]

カジメ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

図 3-33 (2) 分布状況の推移 (カジメ) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成 21 年春季]

シダモク分布状況

[平成 22 年春季]

シダモク分布状況

図 3-34 (1) 分布状況の推移 (シダモク) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成24年春季]

シダモク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成26年春季]

シダモク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-34 (2) 分布状況の推移 (シダモク) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成28年春季]

シダモク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

シダモク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-34 (3) 分布状況の推移 (シダモク) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成 21 年春季]

タマハハキモク分布状況

[平成 22 年春季]

タマハハキモク分布状況

図 3-36 (1) 分布状況の推移 (タマハハキモク) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成24年春季]

タマハハキモク分布状況

[平成26年春季]

タマハハキモク分布状況

図 3-36 (2) 分布状況の推移 (タマハハキモク) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成24年春季]

ヨレモクモドキ分布状況

[平成26年春季]

ヨレモクモドキ分布状況

図 3-37 (2) 分布状況の推移 (ヨレモクモドキ) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

【その他 主要な海藻】

藻場構成種を除く主要な海藻として、前回調査（平成 28 年度）までに確認されている種を含め、アオサ属、ススカケベニ、フダラク、ベニスナゴ、カバノリ、マクサ、ツルツルの 7 種について分布図を作成した。

① アオサ属（図 3-38）

アオサ属は、平成 21～22 年度、平成 24 年度および平成 26 年度に各護岸の±0～-7m の範囲で広く分布が確認されたが、平成 24 年度から平成 26 年度にかけて各護岸の分布範囲は減少傾向にあった。平成 28 年度の調査では、各護岸の±0～-4m 付近で分布が確認されたが、平成 26 年度と比較して、南護岸を中心として分布範囲の増加傾向がみられた。今回の調査では、各護岸の±0～-7m 付近で分布が確認され、平成 28 年度と分布範囲に大きな変化はなかった。

② ススカケベニ（図 3-39）

ススカケベニは、平成 21～22 年度、平成 24 年度および平成 26 年度に各護岸の±0～-10m 付近で広く分布が確認された。平成 28 年度の調査では、各護岸の-3～-10m で広く分布が確認されたが、北護岸、南護岸では過年度と比較して分布範囲の減少がみられた。今回の調査でも、各護岸の-4～-9m で分布が確認されたが、平成 28 年度よりもさらに分布範囲の減少が認められた。

③ フダラク（図 3-40）

フダラクは、平成 21～22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度および平成 28 年度に各護岸の±0～-9m 付近で広く分布が確認された。今回の調査でも、各護岸の±0～-9m 付近で広く分布が確認された。

④ ベニスナゴ（図 3-41）

ベニスナゴは、平成 21 年度は分布が確認されず、平成 22 年度、平成 24 年度、平成 26 年度に各護岸の-1～-9m 付近で広く分布が確認された。平成 24 年度および平成 26 年度は平成 22 年度と比較して被度の増加がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の-1～-10m で広く分布が確認されたが、平成 24 年度、平成 26 年度に比較して、北護岸では分布範囲および被度の減少が、西護岸では被度の減少がみられた。今回の調査では、各護岸の±0～-9m で広く分布が確認され、平成 28 年度に比較して、北護岸と西護岸では被度の増大が、南護岸では被度の減少が認められた。

⑤ カバノリ (図-42)

カバノリは、平成 21 年度は分布が確認されず、平成 22 年度に各護岸で分布が確認されたが、平成 24 年度は分布が確認されなかった。平成 26 年度、平成 28 年度の調査では、各護岸の-1~-7m 付近で広く分布が確認された。今回の調査でも、各護岸の-1~-10m 付近で広く分布が確認され、平成 28 年度に比べて、分布範囲および被度の増大が認められた。

⑥ マクサ (図 3-43)

マクサは、平成 21~22 年度の調査では分布が確認されなかったが、平成 24 年度に北護岸と南護岸の各 1 箇所分布が確認された。平成 26 年度の調査では分布が確認されなかった。平成 28 年度の調査では、南護岸の-3m で分布を確認した。今回の調査では、各護岸の-4~-9m 付近の狭い範囲で分布を確認した。

⑦ ツルツル (図 3-44)

ツルツルは、平成 21~22 年度の調査で分布は確認されなかった。平成 24 年度は各護岸の±0~-5m で広く分布が確認された。平成 26 年度の調査では、各護岸に分布が確認されたが、平成 24 年度と比較して南護岸、西護岸で分布範囲の減少がみられた。平成 28 年度の調査では、各護岸の±0~-2m に分布が確認され、平成 26 年度と比較して北護岸では分布範囲の減少が、西護岸、南護岸では分布範囲の増加がみられた。今回の調査では、各護岸の-1~-5m で分布を確認し、平成 28 年度と比べて、北護岸、西護岸では分布範囲の増大が、南護岸では分布範囲の縮小が認められた。

[平成 21 年春季]

アオサ属分布状況

[平成 22 年春季]

アオサ属分布状況

図 3-38 (1) 分布状況の推移 (アオサ属) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成28年春季]

アオサ属分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

アオサ属分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-38 (3) 分布状況の推移 (アオサ属) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成 21 年春季]

ススカケベニ分布状況

[平成 22 年春季]

ススカケベニ分布状況

図 3-39 (1) 分布状況の推移 (ススカケベニ) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成24年春季]

ススカケベニ分布状況

[平成26年春季]

ススカケベニ分布状況

図 3-39 (2) 分布状況の推移 (ススカケベニ) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成28年春季]

ススカケベニ分布状況

[平成30年春季]

ススカケベニ分布状況

図 3-39 (3) 分布状況の推移 (ススカケベニ) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成 21 年春季]

フダラク分布状況

[平成 22 年春季]

フダラク分布状況

図 3-40 (1) 分布状況の推移 (フダラク) 大阪沖 平成 21~22 年度調査

[平成24年春季]

フダラク分布状況

[平成26年春季]

フダラク分布状況

図 3-40 (2) 分布状況の推移 (フダラク) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成28年春季]

フダラク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

フダラク分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-40 (3) 分布状況の推移 (フダラク) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成24年春季]

ベニスナゴ分布状況

[平成26年春季]

ベニスナゴ分布状況

図 3-41 (2) 分布状況の推移 (ベニスナゴ) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成28年春季]

ベニスナゴ分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

ベニスナゴ分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-41 (3) 分布状況の推移 (ベニスナゴ) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成28年春季]

カバノリ分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

カバノリ分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-42 (3) 分布状況の推移 (カバノリ) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

[平成24年春季]

マクサ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

被覆石										消波ブロック			
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	2	1	0

[平成26年春季]

マクサ分布状況

被度区分
■ : 5%未満
■ : 5~25%
■ : 26~50%
■ : 51~75%
■ : 76~100%

被覆石										消波ブロック			
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	2	1	0

※：平成 21~22 年度の調査では、目立った分布は確認されていない。

図 3-43 (1) 分布状況の推移 (マクサ) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成24年春季]

ツルツル分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成26年春季]

ツルツル分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

※：平成 21~22 年度の調査では、目立った分布は確認されていない。

図 3-44 (1) 分布状況の推移 (ツルツル) 大阪沖 平成 24~26 年度調査

[平成28年春季]

ツルツル分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

[平成30年春季]

ツルツル分布状況
 被度区分
 5%未満
 5~25%
 26~50%
 51~75%
 76~100%

図 3-44 (2) 分布状況の推移 (ツルツル) 大阪沖 平成 28~30 年度調査

4 結果のまとめ

4-1 付着動植物の状況

(1) 神戸沖埋立処分場

・坪刈りによる調査結果

[植物]

表 4-1 に神戸沖埋立処分場における坪刈り調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

今回の調査では、上層で緑藻のアオサ属が湿重量の 94%を占め、中層ではシダモク（藻場を構成する一年生の大型褐藻類）が 94%を占めていた。下層ではムカデノリが 95%を占め、紅藻類が優占する状況であった。

過年度の海藻の出現傾向は、平均水面付近（上層）の波当たりの大きい水深帯で緑藻のシオグサ属、アオサ属等の小型藻類が優占し、中層付近でワカメ、シダモク、タマハハキモク（藻場を構成する一年生の大型褐藻類）が出現し、下層でマクサやススカケベニやムカデノリなどの紅藻類が優占する帯状分布に大きな変化はみられなかった。

表 4-1 坪刈り調査結果概要（植物） 神戸沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
神戸沖 A-2	平成22年 5月30日	出現種類数	11	13	12	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	28.96	130.83	202.92	
		優占種	第1位	シオグサ属 43%	タマハハキモク 84%	マクサ 51%
			第2位	ツノマタ属 36%	イトグサ属 5%	カバノリ 22%
	第3位		アオサ属 18%	フダラク 4%	ススカケベニ 13%	
	平成24年 5月26日	出現種類数	4	13	12	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	254.04	74.91	722.72	
		優占種	第1位	アオサ属 99%	ムカデノリ 33%	ススカケベニ 55%
			第2位	シオグサ属 <0.1%	タマハハキモク 30%	ベニスナゴ 26%
	第3位		アオノリ属 <0.1%	イトグサ属 22%	マクサ 14%	
	平成26年 6月1日	出現種類数	4	17	11	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	32.53	125.78	71.83	
		優占種	第1位	アオサ属 100%	ムカデノリ 60%	マクサ 38%
			第2位	シオグサ属 0.1%	タマハハキモク 30%	ムカデノリ 27%
	第3位		アオノリ属 <0.1%	フダラク 5%	カバノリ 24%	
	平成28年 5月28日	出現種類数	6	14	14	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	93.09	159.32	4.7	
		優占種	第1位	アオサ属 100%	ワカメ 87%	マクサ 79%
			第2位	シオグサ属 <0.1%	マクサ 9%	イギス科 9%
			第3位	藍藻綱 <0.1%	カバノリ 4%	カバノリ 7%
マルバアマノリ <0.1%						
イソダンツウ <0.1%						
イギス科 <0.1%						
平成30年 6月2日	出現種類数	7	14	10		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	142.41	58.48	16.44		
	優占種	第1位	アオサ属 94%	シダモク 94%	ムカデノリ 95%	
		第2位	シオグサ属 5%	フダラク 3%	ツノマタ属 3%	
第3位		アオノリ属 0.5%	ムカデノリ 1%	ヨツガサネ属 0.9%		

[動物]

表 4-2 に神戸沖埋立処分場における坪刈り調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

今回の調査では、上層で二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）が個体数において 66%、湿重量において 75% で大半を占めていた。中層では、甲殻類のマルエラワレカラ（移動性）が個体数において 44%、湿重量において 18% で最優占していた。下層では、個体数においては環形動物の Cirratulus 属（移動性）が 39%、湿重量においては尋常海綿綱（固着性）が 24% を占め、優占していた。

これまでの調査と比較して、上層ではムラサキイガイの占める割合が高くなっており、中層～下層ではキヌマトイガイ（固着性）、環形動物（移動性）、微小甲殻類（移動性）、ヒトデ類（移動性）が優占している状況に大きな変化はみられないが、下層で尋常海綿綱が湿重量で最優占したことは、今までにない傾向である。

表 4-2 坪刈り調査結果概要（動物） 神戸沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
神戸沖 A-2	平成22年 5月30日	出現種類数	24	63	65	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	246	13662	3296	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	2.38	237.47	103.7	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 33%	マルエワレカラ 49%	マルエワレカラ 38%
			第2位	ヒゲナガヨコエビ属 18%	エゾカサネカンザシ 23%	オサデレカラ 16%
			第3位	ユスリカ科幼虫 13%	キヌマトイガイ 11%	ムギガイ 13%
	優占種 (湿重量)	第1位	カラマツガイ 35%	イトマキヒトデ 34%	イトマキヒトデ 28%	
		第2位	ムラサキイガイ 13%	エゾカサネカンザシ 32%	レイシガイ 23%	
		第3位	チゴケムシ 13%	ムギガイ 9%	ムギガイ 17%	
	平成24年 5月26日	出現種類数	20	37	48	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	2105	15472	7178	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	21.13	126.97	95.2	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 41%	キヌマトイガイ 50%	Zeuxo属 17%
			第2位	ユスリカ科幼虫 24%	Zeuxo属 33%	トゲワレカラ 17%
			第3位	タマキビ 7%	マルエワレカラ 4%	キヌマトイガイ 13%
	優占種 (湿重量)	第1位	カラマツガイ 34%	キヌマトイガイ 29%	イトマキヒトデ 28%	
		第2位	マガキ 24%	レイシガイ 17%	キヌマトイガイ 11%	
		第3位	ムラサキイガイ 18%	イトマキヒトデ 15%	レイシガイ 10%	
	平成26年 6月1日	出現種類数	17	70	92	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	3401	5434	7175	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	72.14	45.32	64.2	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 91%	キヌマトイガイ 45%	Caprella属 22%
			第2位	ユスリカ科幼虫 3%	マルエワレカラ 15%	キヌマトイガイ 18%
			第3位	イワフジツボ 2%	トゲワレカラ 10%	Monocorophium属 11%
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 88%	キヌマトイガイ 56%	キヌマトイガイ 27%		
	第2位	マガキ 6%	マルエワレカラ 8%	キヒトデ 10%		
	第3位	カラマツガイ 2%	ムギガイ 7%	Cirratulus属 9%		
平成28年 5月28日	出現種類数	24	43	41		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	21669	3197	503		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	265.77	117.25	11.47		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 98%	ミスヒキゴカイ科 52%	Aoroides属 45%	
		第2位	シロマダラリス 0.5%	Caprella属 15%	キヌマトイガイ 23%	
		第3位	シケンウミゼミ 0.3%	キヌマトイガイ 7%	ムギガイ 5%	
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 94%	ミスヒキゴカイ科 75%	イトマキヒトデ 40%		
	第2位	イボニシ 4%	イトマキヒトデ 8%	イボニシ 13%		
	第3位	ヒトツブゴカイ 1%	Thelepus属 4%	キヌマトイガイ 11%		
平成30年 6月2日	出現種類数	25	61	41		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	22706	5248	309		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	608.77	35.79	35.68		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 66%	マルエワレカラ 44%	Cirratulus属 39%	
		第2位	イワフジツボ 18%	クマノアシツキ 17%	ミスヒキゴカイ科 11%	
		第3位	ホトギスガイ 5%	Caprella属 7%	クマノアシツキ 7%	
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 75%	マルエワレカラ 18%	尋常海綿綱 24%		
	第2位	イワフジツボ 18%	エゾカサネカンザシ 11%	Cirratulus属 22%		
	第3位	ヒトツブゴカイ 3%	キヒトデ 9%	キヒトデ 16%		

・目視観察による調査結果

[植 物]

表 4-3 に神戸沖埋立処分場における目視調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

A-2 の地点では、平均水面付近の主要種は経年的にアオサ属、アオノリ属などの小型の緑藻類であった。また、-1m 以深ではマクサ、ススカケベニ、ツルツル、カバノリ、イギス目などの紅藻、藻場を構成する一年生の大形褐藻類であるタマハハキモクが多くみられた。今回の調査では-3m においてシダモク（藻場を構成する一年生の大形褐藻類）が主要種となっていた。

A-4 の地点のこれまでの調査では、平均水面付近の主要種は緑藻のアオサ属やシオグサ属などであった。また、-1m 以深ではススカケベニ、フダラク、ツルツル、ベニスナゴ、カバノリ、イギス目などの紅藻、藻場を構成する一年生の大形褐藻類であるワカメやタマハハキモクが多くみられた。今回の調査では、-2～-3m でワカメが主要種となっていた。

A-5 の地点では、これまでの調査では-1m 付近でアオサ属が確認され、-2m 以深でベニスナゴ、サビ亜科、イギス目などの紅藻が多くみられた。今回の調査では、-6m 付近でイギス目が主要種となっていた。

表 4-3 目視調査結果概要（植物） 神戸沖埋立処分場

A-2	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	ケ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	藍藻綱	アオサ属 珪藻綱	タマハキモク ツルツル フダラク	ムカデノリ属 イギス科 マクサ ベニスナゴ	シダモク イギス科 マクサ ベニスナゴ	マクサ ベニスナゴ カバノリ	イギス科 マクサ カバノリ ススカケベニ	イギス科 タオヤギソウ ススカケベニ	イギス科 ススカケベニ	-	-	-	-	-
	平成24年5月26日	アオノリ属	アオサ属	タマハキモク	ツルツル イギス目	ツルツル	マクサ ススカケベニ ベニスナゴ	マクサ ススカケベニ ベニスナゴ	マクサ タオヤギソウ	-	イギス目	-	-	-	-
	平成26年6月1日	-	アオサ属	-	タマハキモク ムカデノリ カバノリ	タマハキモク マクサ カバノリ	タマハキモク マクサ	ムカデノリ イトグサ属	イトグサ属	-	-	-	-	-	-
	平成28年5月28日	-	アオサ属	-	-	-	イギス目	イギス目	イギス目	イギス目	-	-	-	-	-
	平成30年6月2日	-	アオサ属	-	-	-	シダモク	-	-	-	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日	2	6	8	8	7	8	7	6	3	2	1	0	-	
	平成24年5月26日	1	8	11	10	8	6	5	8	7	3	1	2	-	
	平成26年6月1日	1	2	7	10	9	7	7	6	4	1	2	1	0	
	平成28年5月28日	2	3	6	9	7	8	6	6	4	1	1	1	-	
	平成30年6月2日	2	3	8	12	10	6	5	4	4	2	2	1	-	

A-4	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	フ-ソ	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	-	シオグサ属 ツノマタ属 フダラク	シオグサ属 フダラク	アオサ属 タマハキモク フダラク	アオサ属 フダラク ベニスナゴ イギス科 カバノリ	ベニスナゴ イギス科	ベニスナゴ サンゴモ目 ススカケベニ	サンゴモ目 ススカケベニ	ススカケベニ	-	-	-	-	-
	平成24年5月26日	-	アオサ属	ツルツル	ツルツル イギス目	ツルツル カバノリ イギス目	フダラク ベニスナゴ カバノリ イギス目	ススカケベニ ベニスナゴ カバノリ イギス目	ススカケベニ カバノリ イギス目	ススカケベニ イギス目	-	-	-	-	
	平成26年6月1日	-	-	フダラク	アオサ属 タマハキモク フダラク ツノマタ	ワカメ タマハキモク カバノリ	ワカメ タマハキモク カバノリ	-	マクサ	-	-	-	-	-	
	平成28年5月28日	-	アオサ属	-	-	-	カバノリ イギス目	イギス目	イギス目	イギス目	-	-	-	-	
	平成30年6月2日	-	-	-	ワカメ	ワカメ	-	-	-	-	-	-	-	-	
種類数	平成22年5月30日	0	5	7	11	11	6	6	5	2	2	0	0	-	
	平成24年5月26日	0	5	8	9	8	12	6	5	5	1	0	-		
	平成26年6月1日	0	2	5	9	8	7	11	6	4	4	2	2	1	
	平成28年5月28日	0	5	6	7	6	4	3	5	4	4	1	0	-	
	平成30年6月2日	0	3	8	6	6	6	5	4	3	3	1	0	-	

A-5	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	ケ-ソ	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫巨礫	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	-	アオノリ属 珪藻綱	アオサ属 珪藻綱	アオサ属 シオグサ属	アオサ属 シオグサ属	-	サンゴモ目 イワノカワ科	サンゴモ目	サンゴモ目	サンゴモ目	サンゴモ目	-	-	-
	平成24年5月26日	-	-	アオサ属	ベニスナゴ イギス目	ベニスナゴ イギス目	ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	ベニスナゴ イギス目	ベニスナゴ イギス目	イギス目	イギス目	-	-	
	平成26年6月1日	-	-	アオサ属 フダラク	ベニスナゴ フダラク	ベニスナゴ	シダモク サビ亜科 ベニスナゴ	サビ亜科 ベニスナゴ	サビ亜科 ベニスナゴ	サビ亜科 ベニスナゴ	サビ亜科 ベニスナゴ	サビ亜科	サビ亜科	ススカケベニ	-
	平成28年5月28日	-	-	-	イギス目	イギス目	イギス目	-	-	-	-	-	-	-	
	平成30年6月2日	-	-	-	-	-	-	-	イギス目	-	-	-	-	-	
種類数	平成22年5月30日	0	3	7	5	2	4	3	2	3	2	1	0	-	
	平成24年5月26日	0	0	5	6	5	6	6	8	7	4	3	4	0	
	平成26年6月1日	0	0	6	3	6	8	8	6	5	3	3	2	0	
	平成28年5月28日	0	0	2	4	4	3	4	4	2	2	2	2	0	
	平成30年6月2日	0	0	4	7	8	9	5	4	2	2	2	2	0	

※主要種：観察時の出現被度が10%以上の種を抽出

[動物]

表 4-4 に神戸沖埋立処分場における目視調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

A-2 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m で、主に潮間帯上部から飛沫帯に生息する巻貝のタマキビ、アラレタマキビ（移動性）が多くみられた。平均水面以深では二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）や環形動物のカンザシゴカイ科（固着性）が多く出現した。今回の調査も同様の傾向であるが、これまでの調査と比較して、カンザシゴカイ科があまりみられなかった。

A-4 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m でタマキビ、アラレタマキビやイワフジツボ（固着性）が多くみられた。平均水面付近では巻貝類のイボニシ、キクノハナガイ（移動性）や二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）が、平均水面以深では巻貝類のレイシガイ（移動性）やカンザシゴカイ科やキヒトデ（移動性）が多く出現した。今回の調査では、アラレタマキビ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

A-5 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m でタマキビ、アラレタマキビが多くみられた。平均水面付近ではイワフジツボやムラサキイガイが、平均水面以深ではレイシガイ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、キヒトデが多くみられた。今回の調査では、アラレタマキビ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

表 4-4 目視調査結果概要（動物） 神戸沖埋立処分場

A-2	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	ケーツ	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	アラレタマキビ	-	カンザシゴカイ科 レイシガイ	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	キヒトデ イトマキヒトデ	キヒトデ イトマキヒトデ	キヒトデ	-	-	-
	平成24年5月26日	タマキビ アラレタマキビ	イボニシ カラマツガイ	イボニシ	イボニシ	イボニシ カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	ムギガイ カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	キヒトデ	イトマキヒトデ	-	イトマキヒトデ	-	キヒトデ	-	-
	平成26年6月1日	アラレタマキビ	カラマツガイ ムラサキイガイ イワフジツボ	ムラサキイガイ	-	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	菅虫綱	-	キヒトデ	-	-	-	-	-
	平成28年5月28日	タマキビ アラレタマキビ	ムラサキイガイ	-	-	カンザシゴカイ科 キヒトデ	カンザシゴカイ科	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年6月2日	タマキビ アラレタマキビ	ムラサキイガイ	キヒトデ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日		2	7	5	3	4	4	4	5	3	1	2	0	-
	平成24年5月26日		4	4	5	4	4	11	7	11	6	4	4	3	-
	平成26年6月1日		3	5	5	6	7	7	8	6	5	5	4	5	0
	平成28年5月28日		3	5	6	4	5	6	9	9	4	3	2	0	-
	平成30年6月2日		3	5	5	6	7	8	9	5	4	5	2	1	-

A-4	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック砂泥	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	アラレタマキビ イワフジツボ	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 イボニシ	チホレイシモンネツク カンザシゴカイ科 コケムシ綱	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	-	キヒトデ	キヒトデ	-	-	-	-	-
	平成24年5月26日	タマキビ アラレタマキビ イワフジツボ	レイシガイ イボニシ サンカクフジツボ	レイシガイ サンカクフジツボ	カンザシゴカイ科 キヒトデ	カンザシゴカイ科	レイシガイ カンザシゴカイ科	-	レイシガイ	-	キヒトデ	イトマキヒトデ	-	-	-
	平成26年6月1日	タマキビ アラレタマキビ	キクノハナガイ ムラサキイガイ イワフジツボ	ムラサキイガイ	海綿動物門 カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成28年5月28日	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ ムラサキイガイ イタボガキ科	レイシガイ ムラサキイガイ	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 キヒトデ	裸眼目 キヒトデ	-	キヒトデ	-	-	-	-	-	-
	平成30年6月2日	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ カラマツガイ ムラサキイガイ	ムラサキイガイ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	-	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日		2	8	7	5	3	5	1	2	1	0	0	1	-
	平成24年5月26日		4	5	9	9	6	9	11	7	7	4	4	1	-
	平成26年6月1日		3	8	6	7	8	8	5	4	4	2	2	1	1
	平成28年5月28日		2	7	7	7	11	10	8	7	7	4	4	2	-
	平成30年6月2日		2	8	6	8	9	8	9	7	5	6	4	2	-

A-5	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	調査日	基質	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫小礫	大礫巨礫	砂泥
主要種※	平成22年5月30日	タマキビ アラレタマキビ	-	レイシガイ イトマキヒトデ	レイシガイ ヨロロツバフジツボ	ヨロロツバフジツボ イトマキヒトデ	キヒトデ イトマキヒトデ	キヒトデ	-	キヒトデ	-	キヒトデ	-	-	-
	平成24年5月26日	-	イワフジツボ クロフジツボ	レイシガイ カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	レイシガイ サンカクフジツボ イトマキヒトデ	カンザシゴカイ科 サンカクフジツボ イトマキヒトデ	サンカクフジツボ イトマキヒトデ	カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	サンカクフジツボ	カゴメガイ イトマキヒトデ キヒトデ	イトマキヒトデ	キヒトデ	-	-	-
	平成26年6月1日	アラレタマキビ	ヨメガサガイ コモレビコガモガイ カラマツガイ イワフジツボ	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	菅虫綱	カンザシゴカイ科 イトマキヒトデ	-	キヒトデ	-	-	-	-	-	-
	平成28年5月28日	アラレタマキビ	ムラサキイガイ イワフジツボ	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	キヒトデ イトマキヒトデ	マナマコ	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年6月2日	-	アラレタマキビ ムラサキイガイ イワフジツボ	ムラサキイガイ	ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	-	キヒトデ	-	-	-	-	菅虫綱	-	-
種類数	平成22年5月30日		4	6	5	3	6	6	6	4	5	2	1	0	-
	平成24年5月26日		1	5	7	9	8	5	5	5	8	8	5	6	0
	平成26年6月1日		1	9	8	12	13	13	13	13	10	6	6	6	1
	平成28年5月28日		2	7	8	9	12	9	10	6	6	7	7	5	0
	平成30年6月2日		0	6	5	8	10	8	6	8	7	7	7	4	0

※主要種：観察時の個体数が3個体以上または出現被度が10%以上の種を抽出

(2) 大阪沖埋立処分場

・坪刈りによる調査結果

[植 物]

表 4-5 に大阪沖埋立処分場における坪刈り調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

今回の調査では、上層ではフダラクが 66%次いでツルツルが 21%と、紅藻類が優占していた。中層ではワカメ（藻場を構成する一年生の大型褐藻類）が 76%を占め、下層でもワカメが 67%を占め、最優占していた。

これまでの調査と比較すると、上層では前回以前の緑藻のアオサ属など小型藻類に代わって紅藻類が優占していた。中層では前回調査の藻場を構成するワカメやタマハハキモクといった大型褐藻類、または紅藻類が優占する状況に変化はなかった。また、下層では前回以前の紅藻類や小型褐藻類のフクロノリが優占する状況からワカメが最優占する状況に変化していた。

表 4-5 坪刈り調査結果概要（植物） 大阪沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項 目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
大阪沖 C-2	平成22年 5月29日	出現種類数	6	17	16	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	0.98	132.22	368.18	
		優占種	第1位	アオサ属 89%	ススカケベニ 51%	ススカケベニ 93%
			第2位	アオノリ属 8%	ベニスナゴ 15%	フダラク 7%
	第3位		シオグサ属 3%	フダラク 14%	ツノマタ属 <0.1%	
	平成24年 6月3日	出現種類数	5	14	16	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	7.46	1819.04	849.48	
		優占種	第1位	アオサ属 95%	フダラク 89%	ベニスナゴ 61%
			第2位	ツノマタ属 2%	オオバツノマタ 8%	ワカメ 21%
	第3位		コスシツツナギ 1%	タマハハキモク 3%	オオバツノマタ 3%	
	平成26年 5月31日	出現種類数	3	14	15	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	1.45	626.89	362.29	
		優占種	第1位	アオサ属 98%	ワカメ 42%	ベニスナゴ 81%
			第2位	藍藻綱 2%	タマハハキモク 40%	ツルツル 13%
	第3位		シオグサ属 <0.1%	ムカデノリ属 6%	ワカメ 4%	
	平成28年 5月29日	出現種類数	10	12	12	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	12.6	465.33	4.69	
		優占種	第1位	アオサ属 78%	ツノマタ 57%	フクロノリ 61%
			第2位	シオグサ属 16%	オオバツノマタ 15%	アオサ属 14%
	第3位		ツノマタ 4%	フダラク 14%	ワカメ 14%	
平成30年 6月3日	出現種類数	10	19	15		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	158.89	1210.95	90.94		
	優占種	第1位	フダラク 66%	ワカメ 76%	ワカメ 67%	
		第2位	ツルツル 21%	フダラク 19%	フダラク 26%	
第3位		カバノリ 11%	カバノリ 2%	カバノリ 4%		

[動物]

表 4-6 に大阪沖埋立処分場における坪刈り調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

今回の調査では、上層で二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）が個体数において 89%、湿重量において 98% で大半を占めていた。中層では、二枚貝のキヌマトイガイ（固着性）が個体数において 22%、湿重量において 26% で最優占していた。下層では、環形動物のクマノアシツキ（移動性）が個体数において 52%、シロボヤ科（固着性）が湿重量において 71% を占め、優占していた。

これまでの調査と比較して、上層でムラサキイガイが優占種となっている状況に大きな変化はみられず、中層では平成 22 年度に最優占種となっていたキヌマトイガイが優占していた。また、下層については過去に優占していた尋常海綿綱、シマメノウフネガイやコシダカガンガラなどの小型の巻貝類（移動性）、ワレカラ類（移動性）に変わり個体数についてはクマノアシツキ、湿重量についてはシロボヤ科が最優占していた。

表 4-6 坪刈り調査結果概要（動物） 大阪沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
大阪沖 C-2	平成22年 5月29日	出現種類数	18	60	56	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	11998	5541	348	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	201.84	127.1	72.77	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 99%	キヌマトイガイ 16%	ムギガイ 14%
			第2位	クマトリコガイ <0.1%	マルエラレカラ 15%	オサテレカラ 14%
			第3位	ユンボソコヒ属 <0.1%	アリアドロダムシ 14%	Thelepus属 11%
	優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 100%	Thelepus属 38%	コシダカソウ 53%	
		第2位	クマトリコガイ <0.1%	エゾカサネカンザシ 17%	コベルトフネガイ 13%	
		第3位	シロダラシリス <0.1%	キヌマトイガイ 8%	Thelepus属 8%	
	平成24年 6月3日	出現種類数	15	35	49	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	788	7094	179	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	72.06	55.73	7.97	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 77%	Monocorophium属 42%	Caprella属 20%
			第2位	Ampithoe属 7%	エゾカサネカンザシ 36%	トゲワレカラ 13%
			第3位	イボニシ 4%	マルエラレカラ 9%	ウエトロダムシ 4%
	優占種 (湿重量)	第1位	イボニシ 62%	エゾカサネカンザシ 40%	コシダカソウ 30%	
		第2位	ヨメガカサ 23%	Thelepus属 10%	レイシガイ 26%	
		第3位	ムラサキイガイ 3%	マサゴコガイ 9%	ムギガイ 8%	
	平成26年 5月31日	出現種類数	23	59	54	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	11802	6437	784	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	653.98	53.08	22.98	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 94%	マルエラレカラ 40%	Caprella属 42%
			第2位	イワフジツボ 5%	ムラサキイガイ 25%	トゲワレカラ 11%
			第3位	キクノハナガイ 0.2%	キヌマトイガイ 13%	ユンボソコヒ科 7%
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 96%	ムラサキイガイ 36%	シマノフネガイ 52%		
	第2位	ヒザラガイ 1%	マルエラレカラ 16%	コシダカソウ 19%		
	第3位	キクノハナガイ 1%	キヌマトイガイ 11%	ムギガイ 10%		
平成28年 5月29日	出現種類数	26	57	52		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	14125	5863	1655		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	6579.56	67.31	56.82		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 83%	マルエラレカラ 57%	Aoroides属 37%	
		第2位	マルエラレカラ 14%	ムラサキイガイ 11%	Caprella属 22%	
		第3位	Hyale属 0.7%	Aoroides属 10%	Syllinae亜科 7%	
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 91%	マガキ 41%	尋常海綿綱 40%		
	第2位	マガキ 5%	マルエラレカラ 19%	オオヘビガイ 22%		
	第3位	イタボガキ科 3%	ムギガイ 7%	ミスヒキコガイ科 10%		
平成30年 6月3日	出現種類数	46	71	68		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	90351	9489	10194		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	9252.9	171.06	591.04		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 89%	キヌマトイガイ 22%	クマノアシツキ 52%	
		第2位	ユスリカ科 4%	マルエラレカラ 20%	キヌマトイガイ 17%	
		第3位	ヨ-ロッパフジツボ 4%	Caprella属 15%	Caprella属 5%	
優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 98%	キヌマトイガイ 26%	シロボヤ科 71%		
	第2位	ヒザラガイ 0.8%	Thelepus属 14%	クマノアシツキ 8%		
	第3位	ヨ-ロッパフジツボ 0.3%	レイシガイ 12%	キヌマトイガイ 5%		

・目視観察による調査結果

[植 物]

表 4-7 に大阪沖埋立処分場における目視調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

C-1 の地点のこれまでの調査では、-1m 以深ではススカケベニ、フダラク、ツルツル、ベニスナゴなどの紅藻類、藻場を構成する一年生の大形褐藻類であるワカメやシダモクが多くみられた。今回の調査でも、-2m でワカメ、-6～-7m でベニスナゴが主要種となっていた。

C-2 の地点のこれまでの調査では、±0～-1m で緑藻のアオサ属が、-1m 以深ではサンゴモ科、ススカケベニ、ツノマタ属、フダラク、ベニスナゴなどの紅藻類、藻場を構成する一年生の大形褐藻類であるワカメが多くみられた。今回の調査でも、-1m 以深ではサンゴモ科、ツノマタ属、フダラク、ベニスナゴなどの紅藻類、-2～-3m ではワカメが多くみられた。

C-3 の地点のこれまでの調査では、±0～-3m で緑藻のアオサ属やシオグサ属が、-1m 以深ではサンゴモ科、ススカケベニ、フダラク、ツルツル、イワノカワ科、ベニスナゴ、カバノリなどの紅藻類、藻場を構成する一年生の大形褐藻類であるワカメやシダモクやタマハハキモクが主要種となっていた。今回の調査では、-1m でタマハハキモク、-3m でワカメ、-5～-7m でサンゴモ科、イワノカワ科、ベニスナゴが主要種となっていた。

表 4-7 目視調査結果概要（植物） 大阪沖埋立処分場

C-1	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	ケ-ソツ	ケ-ソツ	ケ-ソツ	ケ-ソツ	ケ-ソツ	ケ-ソツ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	-	-	フダラク	フダラク	イギス科 ススカケベニ	シダモク ベニスナゴ	ススカケベニ ベニスナゴ イワノカワ科	イギス科 ススカケベニ イワノカワ科	イギス科 ススカケベニ イワノカワ科	-	-	-	-
	平成24年6月3日	-	-	イギス目	ムカデノリ	ムカデノリ	シダモク ツルツル	ツルツル ベニスナゴ	ススカケベニ ベニスナゴ	ベニスナゴ	ススカケベニ	ススカケベニ	-	-
	平成26年5月31日	-	-	フダラク	ワカメ フダラク	ワカメ フダラク	シダモク フダラク ツルツル ベニスナゴ	ワカメ サビ垂科 フダラク ベニスナゴ イトグサ属	ベニスナゴ タオヤギソウ イトグサ属	ベニスナゴ	ススカケベニ	ススカケベニ	-	-
	平成28年5月29日	-	-	-	-	-	-	ツルツル	サンゴモ科	サンゴモ科 ベニスナゴ	ススカケベニ	-	-	-
	平成30年6月3日	-	-	-	ワカメ	-	-	-	ベニスナゴ	ベニスナゴ	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日	0	1	4	4	2	5	5	3	3	2	1	1	
	平成24年5月26日	0	2	5	6	5	12	6	5	4	4	1	1	
	平成26年5月31日	0	3	3	4	4	8	12	10	10	6	3	3	
	平成28年5月29日	0	2	5	5	1	8	8	6	6	3	3	0	
	平成30年6月3日	0	1	3	5	4	4	9	8	7	4	3	2	
C-2	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	-	アオサ属	フダラク ツノマタ属 ベニスナゴ	フダラク ツノマタ属 ベニスナゴ	ススカケベニ イギス科	ベニスナゴ イワノカワ科	ベニスナゴ イワノカワ科	ベニスナゴ イワノカワ科 サンゴモ科 ベニスナゴ カバノリ	ベニスナゴ イワノカワ科 ススカケベニ サンゴモ目	イワノカワ科 ススカケベニ	イワノカワ科 ススカケベニ	-	-
	平成24年6月3日	-	-	アオサ属 ツノマタ属 フダラク ツルツル	ツノマタ属 フダラク	ツノマタ属 フダラク	ワカメ ツルツル ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ カバノリ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科
	平成26年5月31日	-	-	ワカメ フダラク オオハツノマタ ツノマタ	ワカメ タマハハキモク フダラク	ワカメ フダラク オオハツノマタ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ カバノリ	シダモク サビ垂科 ベニスナゴ タオヤギソウ イトグサ属	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ススカケベニ	イワノカワ科 サビ垂科 ススカケベニ	イワノカワ科 サビ垂科 ススカケベニ	イワノカワ科 サビ垂科
	平成28年5月29日	-	-	アオサ属 ツノマタ属 フダラク	ワカメ ツノマタ属	アオサ属	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科	-	-
	平成30年6月3日	-	-	フダラク	ワカメ フダラク	ワカメ ツノマタ属 フダラク	-	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科 ベニスナゴ	サンゴモ科	サンゴモ科	-	-
種類数	平成22年5月30日	0	1	7	6	5	7	5	5	4	3	1	0	
	平成24年5月26日	0	0	6	7	7	8	7	4	3	4	5	2	
	平成26年5月31日	0	2	8	9	7	7	7	11	7	5	5	3	
	平成28年5月29日	0	1	5	7	5	5	4	1	1	1	3	2	
	平成30年6月3日	0	3	7	7	7	7	5	5	5	3	3	1	
C-3	平均水面(m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	ア'ロツク	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	-	アオサ属	アオサ属 シオグサ属 フダラク	フダラク ベニスナゴ	シダモク	シダモク イワノカワ科 ベニスナゴ	イワノカワ科 ベニスナゴ	イワノカワ科	ススカケベニ	ススカケベニ タオヤギソウ	ススカケベニ	-	-
	平成24年6月3日	-	アオサ属	フダラク ツルツル	フダラク ツルツル	フダラク ツルツル カバノリ	ツルツル フダラク ベニスナゴ カバノリ	ベニスナゴ	ベニスナゴ	サビ垂科 ベニスナゴ	サビ垂科 ベニスナゴ	サビ垂科 ベニスナゴ	サビ垂科 ベニスナゴ	サビ垂科 ススカケベニ
	平成26年5月31日	-	アオサ属	フダラク ツルツル	シオグサ属 フダラク ツルツル	タマハハキモク フダラク ツルツル カバノリ	ワカメ シダモク ツルツル ベニスナゴ カバノリ	サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	イワノカワ科 サビ垂科 ベニスナゴ	サビ垂科	-
	平成28年5月29日	-	シオグサ属	シオグサ属 フダラク	シオグサ属	アオサ属	-	サンゴモ科 イワノカワ科	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科	サンゴモ科 イワノカワ科	サンゴモ科 イワノカワ科	サンゴモ科
	平成30年6月3日	-	-	タマハハキモク	-	ワカメ	-	イワノカワ科 ベニスナゴ	サンゴモ科	サンゴモ科 ベニスナゴ	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日	0	1	4	6	4	4	2	4	5	4	3	1	
	平成24年5月26日	0	2	6	7	9	7	3	3	3	4	4	2	
	平成26年5月31日	0	2	5	6	7	10	6	6	5	5	5	3	
	平成28年5月29日	0	4	8	7	8	8	3	2	3	3	3	1	
	平成30年6月3日	0	2	9	9	10	5	6	4	4	4	4	2	

※主要種：観察時の出現被度が10%以上の種を抽出

[動物]

表 4-8 に大阪沖埋立処分場における目視調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

C-1 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1～±0m で、主に潮間帯上部から飛沫帯に生息する巻貝のアラレタマキビ（移動性）が多くみられた。平均水面付近では巻貝類のイボニシ、カラマツガイ（移動性）や二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）やイワフジツボ（固着性）が、平均水面以深ではムラサキイガイ、環形動物のカンザシゴカイ科（固着性）、ホヤ綱（固着性）などが多く出現した。今回の調査もアラレタマキビ、ムラサキイガイ、イワフジツボなどは同様の出現傾向を示したが、これまでの調査と比較して、カンザシゴカイ科があまりみられず、-4m 以深でキヒトデ（移動性）が連続的に多くみられた。

C-2 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m でアラレタマキビが多くみられた。平均水面付近ではイボニシ、巻貝類のキクノハナガイ（移動性）、ムラサキイガイ、イワフジツボなどが、平均水面以深では尋常海綿綱（固着性）やカンザシゴカイ科が多く出現した。今回の調査でも、アラレタマキビ、キクノハナガイ、ムラサキイガイなどが主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

C-3 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m でアラレタマキビが多くみられた。平均水面付近ではイボニシ、キクノハナガイ、ムラサキイガイなどが、平均水面以深ではイボニシ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱などが多くみられた。今回の調査でも、アラレタマキビ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱が主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

表 4-8 目視調査結果概要（動物） 大阪沖埋立処分場

C-1	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	ケーソク	ケーソク	ケーソク	ケーソク	ケーソク	ケーソク	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	アラレタマキビ	ムラサキイガイ イワフジツボ	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 レイシガイ ホヤ綱	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 ホヤ綱	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 ホヤ綱	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 ホヤ綱	カンザシゴカイ科 コケムシ綱 ホヤ綱	-	-	-	コケムシ綱	コケムシ綱	コケムシ綱
	平成24年6月3日	アラレタマキビ	アラレタマキビ イボニシ カラマツガイ ムラサキイガイ	イボニシ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 ホヤ綱	カンザシゴカイ科 ホヤ綱	ホヤ綱	-	イトマキヒトデ	-	イトマキヒトデ	イトマキヒトデ	イトマキヒトデ	-
	平成26年5月31日	アラレタマキビ	アラレタマキビ キクノハナガイ ムラサキイガイ イワフジツボ	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 ホヤ綱(群党性)	カンザシゴカイ科 ホヤ綱(群党性)	カンザシゴカイ科 ホヤ綱(群党性)	-	-	-	-	-	-	キヒトデ	-
	平成28年5月29日	アラレタマキビ	アラレタマキビ イボニシ カラマツガイ ムラサキイガイ マガキ	コモレビコモガイ イボニシ カラマツガイ ムラサキイガイ マガキ	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	-	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年6月3日	アラレタマキビ	アラレタマキビ コモレビコモガイ カラマツガイ ムラサキイガイ イタボガキ科 イワフジツボ	ムラサキイガイ	ムラサキイガイ	-	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ	キヒトデ
種類数	平成22年5月30日		1	3	8	5	8	5	3	3	4	6	2	2
	平成24年5月26日		2	11	8	6	5	7	6	7	4	3	3	3
	平成26年5月31日		3	8	8	8	9	5	6	3	3	4	3	2
	平成28年5月29日		2	8	6	7	9	6	5	4	3	3	2	2
	平成30年6月3日		1	7	4	8	10	8	5	6	5	5	3	4

C-2	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	-	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 ホヤ綱	カンザシゴカイ科 ホヤ綱	コシダカガンガラ イトマキヒトデ	コシダカガンガラ サンカクフジツボ	-	-	-	-	-
	平成24年6月3日	アラレタマキビ	イボニシ キクノハナガイ イワフジツボ	イボニシ	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科	-	-	イトマキヒトデ	-	キヒトデ	-	-	
	平成26年5月31日	アラレタマキビ	ヨメガカサ ウツアシ キクノハナガイ ムラサキイガイ イワフジツボ	レイシガイ	ムギガイ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	-	-	-	-	-	-	-	
	平成28年5月29日	アラレタマキビ	コモレビコモガイ イボニシ カラマツガイ キクノハナガイ イタボガキ科	-	-	カンザシゴカイ科	-	尋常海綿綱	苔虫綱	-	-	-	-	
	平成30年6月3日	アラレタマキビ	コモレビコモガイ カラマツガイ キクノハナガイ ムラサキイガイ	ムラサキイガイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
種類数	平成22年5月30日		1	2	3	8	5	4	6	4	5	6	5	2
	平成24年5月26日		2	10	4	7	7	6	7	6	4	3	7	4
	平成26年5月31日		3	10	7	7	10	4	4	2	3	2	1	3
	平成28年5月29日		2	10	6	6	6	4	5	5	3	4	3	2
	平成30年6月3日		2	6	4	5	8	8	6	5	3	5	3	2

C-3	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	調査日	基質	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	フ'ロック	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫
主要種※	平成22年5月29日	-	ムラサキイガイ	-	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 ヤドカリ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	コケムシ綱	-	コケムシ綱	コケムシ綱	-
	平成24年6月3日	アラレタマキビ	イボニシ キクノハナガイ	イボニシ カンザシゴカイ科	イボニシ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	尋常海綿綱 苔虫綱 ムギガイ	コシダカガンガラ	イトマキヒトデ	-	-	-	-
	平成26年5月31日	-	イボニシ ムラサキイガイ	レイシガイ ムラサキイガイ	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科	-	-	-	-	苔虫綱	苔虫綱	アミコケムシ科
	平成28年5月29日	アラレタマキビ	キクノハナガイ ムラサキイガイ	イボニシ ムラサキイガイ	-	カンザシゴカイ科	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年6月3日	アラレタマキビ	ムラサキイガイ	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	-	-	苔虫綱	苔虫綱	-	-	-	-
種類数	平成22年5月30日		1	5	1	3	5	6	4	6	5	5	3	3
	平成24年5月26日		1	7	3	6	4	5	4	4	3	4	2	3
	平成26年5月31日		3	6	6	9	8	7	7	5	3	3	3	3
	平成28年5月29日		1	4	3	7	7	7	4	4	2	2	1	0
	平成30年6月3日		1	3	3	6	7	6	5	5	4	2	3	3

※主要種：観察時の個体数が3個体以上または出現被度が10%以上の種を抽出

(3) 泉大津沖埋立処分場

・坪刈りによる調査結果

[植 物]

表 4-9 に泉大津沖埋立処分場における坪刈り調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

D-2 では、上層で紅藻のフダラクが 90% を占め、中層ではワカメ（藻場を構成する一年生の大型褐藻類）が 95% を占めていた。下層では紅藻のタオヤギソウが 45% を占め、次いでワカメが 33% を占めていた。これまでの調査と比較すると、上層と下層でフダラク、ムカデノリ属、ベニスナゴ、カバノリ、タオヤギソウなどの紅藻やワカメが優占的であった点、中層については、ワカメが最優占している点で変化がない。

D-3 では、上層で緑藻のミルが 82% を占め、中層ではワカメが 98% を占めていた。下層ではタオヤギソウが 79% を占めていた。これまでの調査では、上層で緑藻のシオグサ属や紅藻のコスジフシツナギ、中層でミルやワカメ、下層でワカメやタオヤギソウが優占する状況であったので、上層のミルについては変化が認められる。

表 4-9 坪刈り調査結果概要 (植物) 泉大津沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
泉大津沖 D-2	平成22年 5月21日	出現種類数	7	7	13	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	7.77	4662.46	960.24	
		優占種	第1位	ベニスナゴ 40%	ワカメ 100%	タオヤギソウ 65%
			第2位	イトグサ属 26%	ベニスナゴ <0.1%	ワカメ 25%
	第3位		フダラク 19%	ツノマタ属 <0.1%	ツノマタ属 5%	
	平成26年 6月2日	出現種類数	11	17	11	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	19.88	242.82	475.51	
		優占種	第1位	ムカデノリ属 50%	ワカメ 85%	カバノリ 46%
			第2位	フダラク 34%	ムカデノリ 5%	ワカメ 33%
	第3位		アオサ属 12%	アオサ属 3%	タオヤギソウ 17%	
	平成28年 6月4日	出現種類数	18	19	11	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	592.1	1080.39	391.83	
		優占種	第1位	ワカメ 74%	ワカメ 99%	ワカメ 85%
			第2位	フダラク 15%	フダラク 0.8%	カバノリ 8%
	第3位		ツルツル 5%	ムカデノリ属 0.2%	タオヤギソウ 6%	
	平成30年 5月26日	出現種類数	15	10	14	
総湿重量 (g/0.25m ²)		72.16	856.91	488.27		
優占種		第1位	フダラク 90%	ワカメ 95%	タオヤギソウ 45%	
		第2位	カバノリ 4%	カバノリ 4%	ワカメ 33%	
	第3位	ツルツル 3%	ムカデノリ 0.9%	カバノリ 12%		
泉大津沖 D-3	平成22年 5月21日	出現種類数	3	4	8	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	0.13	0.4	1.82	
		優占種	第1位	シオグサ属 100%	ミル 70%	ワカメ 84%
			第2位	アオノリ属 <0.1%	ダリア属 28%	アオサ属 15%
	第3位		アオサ属 <0.1%	イトグサ属 3%	アオノリ属 1%	
	平成26年 6月2日	出現種類数	2	8	6	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	0.04	475.27	99.13	
		優占種	第1位	コスシツナギ* 100%	ワカメ 94%	タオヤギソウ 97%
			第2位	シオグサ属 <0.1%	タオヤギソウ 6%	ススカケベニ 3%
	第3位		出現なし	ススカケベニ 0.2%	イギス科 0.3%	
	平成28年 6月4日	出現種類数	2	11	12	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	0.49	45.8	136.19	
		優占種	第1位	シオグサ属 100%	ワカメ 98%	ワカメ 44%
			第2位	アオノリ属 <0.1%	ベニスナゴ 1%	タオヤギソウ 28%
	第3位		出現なし	藍藻綱 1%	ススカケベニ 23%	
	平成30年 5月26日	出現種類数	4	9	5	
総湿重量 (g/0.25m ²)		0.45	122.66	89.61		
優占種		第1位	ミル 82%	ワカメ 98%	タオヤギソウ 79%	
		第2位	シオグサ属 18%	ミル 1%	ワカメ 13%	
	第3位	アオノリ属 <0.1%	オオバツノマタ 0.8%	ススカケベニ 8%		
			藍藻綱 <0.1%			

[動物]

表 4-10 に泉大津沖埋立処分場における坪刈り調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

D-2 の地点では、上層で個体数においては二枚貝のムラサキイガイ（固着性）が 33%、次いで甲殻類のマルエラワレカラ（移動性）が 23%を占め、湿重量においてはムラサキイガイが 38%を占め、次いで巻貝のコシダカガンガラ（移動性）が 15%を占めていた。中層では個体数においては二枚貝のキヌマトイガイ（固着性）が 24%、環形動物のエゾカサネカンザシゴカイ（固着性）が 10%の順であり、湿重量においてはエゾカサネカンザシゴカイが 19%、コシダカガンガラが 18%の順であった。下層では個体数においてはヨーロッパフジツボ（固着性）が 31%、エゾカサネカンザシゴカイが 27%の順であり、湿重量においてはエゾカサネカンザシゴカイが 25%、巻貝のレイシガイ（移動性）が 11%の順であった。これまでの調査と比較すると、上層でムラサキイガイ、マルエラワレカラ、下層でコシダカガンガラ、キヌマトイガイ、エゾカサネカンザシ、ヨーロッパフジツボが優占的である点は同様であった。中層では各年度で優占種が変化する傾向がみられた。

D-3 の地点では、上層では個体数においてはムラサキイガイが 43%、次いでイワフジツボ（固着性）が 12%を占め、湿重量においてはムラサキイガイが 30%、次いで二枚貝のマガキ（固着性）が 21%を占めていた。中層では、環形動物のクマノアシツキ（移動性）が個体数において 78%と大半を占め、湿重量においてはエゾカサネカンザシゴカイが 28%、クマノアシツキが 18%の順であった。下層では個体数においてキヌマトイガイが 29%、次いでエゾカサネカンザシゴカイが 25%を占め、湿重量においてはウミウシ類のカメノコフシエラガイ科（移動性）が 20%、次いでエゾカサネカンザシゴカイが 17%を占めていた。これまでの調査と比較すると、全体的にはムラサキイガイ、キヌマトイガイ、エゾカサネカンザシゴカイが優占的である点で同様の傾向を示したが、最優占種については中層の個体数におけるクマノアシツキ、下層の湿重量におけるカメノコフシエラガイ科については過去に優占種になったことのない種である。

表 4-10 (1) 坪刈り調査結果概要 (動物) 泉大津沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
泉大津沖 D-2	平成22年 5月21日	出現種類数	22	53	52	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	18592	1929	1131	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	807.48	24.63	21.44	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 99%	Zeuxo属 23%	Polydora属 24%
			第2位	マサゴコカイ 0.3%	Jassa属 20%	アリアケトウダムシ 19%
			第3位	シロダラシリス 0.2%	ムラサキイガイ 15%	マルエワレカラ 10%
		優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 97%	ネンエキボヤ 30%	コダカカンガラ 60%
	第2位		レイシガイ 2%	コダカカンガラ 20%	コブコケムシ科 6%	
	第3位		マサゴコカイ 0.2%	レイシガイ 16%	ヒラコケムシ科 6%	
	平成26年 6月2日	出現種類数	31	53	54	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	16584	2425	432	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	1242.48	37.92	30.13	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 99%	ムラサキイガイ 49%	キヌマトイガイ 24%
			第2位	イボニシ 0.3%	キヌマトイガイ 20%	ヨーロッパジツホ 12%
			第3位	Acanthochitona属 0.2%	ヨーロッパジツホ 6%	Jassa属 8%
		優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 94%	ムラサキイガイ 68%	コダカカンガラ 40%
	第2位		イボニシ 5%	キヌマトイガイ 10%	ヒラコケムシ科 27%	
	第3位		Acanthochitona属 1%	レイシガイ 8%	レイシガイ 6%	
	平成28年 6月4日	出現種類数	41	59	74	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	10321	1627	1064	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	202.8	43.28	31.24	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 92%	マルエワレカラ 29%	キヌマトイガイ 51%
			第2位	マルエワレカラ 5%	キヌマトイガイ 15%	エゾカサネカンザシゴカイ 8%
			第3位	キヌマトイガイ 0.9%	ムラサキイガイ 13%	Zeuxo属 4%
優占種 (湿重量)		第1位	イボニシ 48%	裸鰓目 53%	キヌマトイガイ 18%	
	第2位	ムラサキイガイ 38%	ヒラコケムシ科 7%	コダカカンガラ 12%		
	第3位	レイシガイ 5%	尋常海綿綱 5%	エゾカサネカンザシゴカイ 12%		
平成30年 5月26日	出現種類数	29	69	61		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	334	3833	1182		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	27.46	119.74	71.6		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 33%	キヌマトイガイ 24%	ヨーロッパジツホ 31%	
		第2位	マルエワレカラ 23%	エゾカサネカンザシゴカイ 10%	エゾカサネカンザシゴカイ 27%	
		第3位	Jassa属 6%	Caprella属 9%	キヌマトイガイ 10%	
	優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 34%	エゾカサネカンザシゴカイ 19%	エゾカサネカンザシゴカイ 25%	
第2位		コダカカンガラ 15%	コダカカンガラ 18%	レイシガイ 11%		
第3位		ヨメガカサ 12%	キヌマトイガイ 13%	イトマキヒトデ 10%		

表 4-10 (2) 坪刈り調査結果概要 (動物) 泉大津沖埋立処分場

調査地点	調査時期	項目	上層 (M.W.L ±0m)	中層 (M.W.L -2m)	下層 (M.W.L -4m)	
泉大津沖 D-3	平成22年 5月21日	出現種類数	24	60	74	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	38331	14785	3401	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	1719.05	972.33	216.93	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 99%	ムラサキイガイ 71%	エゾササケンザシゴカイ 23%
			第2位	Typosyllis属 0.2%	エゾササケンザシゴカイ 18%	アリアケトログダムシ 19%
			第3位	タマキビ 0.2%	キヌマトイガイ 2%	ドロクダムシ属 8%
		優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 98%	ムラサキイガイ 75%	エゾササケンザシゴカイ 16%
	第2位		カラマツガイ 1%	エゾササケンザシゴカイ 10%	アミコケムシ科 15%	
	第3位		マガキ 1%	レイシガイ 3%	キクザル属 14%	
	平成26年 6月2日	出現種類数	35	89	92	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	38999	13938	7910	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	3736.04	216.08	178.95	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 99%	Phoronis属 58%	Pugettia属 25%
			第2位	キヌマトイガイ 0.4%	キヌマトイガイ 22%	キヌマトイガイ 16%
			第3位	紐形動物門 0.1%	Dodecaceria属 7%	Caprella属 10%
		優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 98%	Phoronis属 20%	フサコケムシ科 33%
	第2位		イボニシ 1%	キヌマトイガイ 18%	ムラサキイガイ 15%	
	第3位		Ostrea属 1%	フサコケムシ科 13%	ハグチコケムシ科 13%	
	平成28年 6月4日	出現種類数	30	68	89	
		総個体数 (個体/0.25m ²)	60745	17276	2069	
		総湿重量 (g/0.25m ²)	5408.33	1332.02	168.55	
		優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 98%	Phoronis属 59%	キヌマトイガイ 25%
			第2位	Syllinae亜科 0.6%	ムラサキイガイ 30%	マルエワレカラ 12%
			第3位	紐形動物門 0.5%	キヌマトイガイ 4%	ムラサキイガイ 7%
優占種 (湿重量)		第1位	ムラサキイガイ 89%	ムラサキイガイ 85%	フサコケムシ科 24%	
	第2位	マガキ 10%	Phoronis属 6%	アミコケムシ科 18%		
	第3位	紐形動物門 0.2%	キヌマトイガイ 2%	ムラサキイガイ 9%		
平成30年 5月26日	出現種類数	43	50	49		
	総個体数 (個体/0.25m ²)	1312	23213	1644		
	総湿重量 (g/0.25m ²)	67.69	400.08	191.36		
	優占種 (個体数)	第1位	ムラサキイガイ 43%	クマノアシツキ 78%	キヌマトイガイ 29%	
		第2位	イワフジツボ 12%	エゾササケンザシゴカイ 7%	エゾササケンザシゴカイ 25%	
		第3位	シラケンウミセミ 11%	マサゴゴカイ 5%	ケヤリムシ科 6%	
	優占種 (湿重量)	第1位	ムラサキイガイ 30%	エゾササケンザシゴカイ 28%	カモノアシエライ科 20%	
第2位		マガキ 21%	クマノアシツキ 18%	エゾササケンザシゴカイ 17%		
第3位		ヨメガカサ 21%	ムラサキイガイ 15%	キヒトデ 15%		

・目視観察による調査結果

[植 物]

表 4-11 に泉大津沖埋立処分場における目視調査結果（植物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

D-2 の地点でのこれまでの調査では、-1~-2m で緑藻類のアオサ属が、±0~-5m では藻場を構成する一年生の大型褐藻類であるワカメが、±0m 以深ではフダラク、ツルツル、カバノリ、タオヤギソウなどの紅藻類が主要種となっていた。今回の調査でも、-1m でアオサ属が、-1~-4m でワカメが、-3~-7m でカバノリ、タオヤギソウなどが多くみられ、同様の出現傾向を示していた。

D-3 の地点でのこれまでの調査では、-1~-5m ではワカメが、-3m 以深ではススカケベニ、タオヤギソウなどの紅藻類が主要種となっていた。今回の調査では、-2m でワカメが主要種となった。

D-5 の地点では、平成 26 年度調査では+1m で藍藻が主要種となっていた。その他の年度では今回の調査も含めて、壁面、遊水室ともに海藻がみられなかった。

D-6 の地点でのこれまでの調査では、壁面の+1~-1m で緑藻類のアオノリ属、アオサ属が、±0~-4m ではワカメが、±0m 以深ではススカケベニ、ムカデノリ、フダラク、ツルツル、タオヤギソウなどの紅藻類が主要種となっていた。遊水室では藻類の生育はわずかであった。今回の調査でも、壁面では-1m でワカメとムカデノリが、-3~-5m でススカケベニ、タオヤギソウなどが多くみられ、遊水室での藻類の繁茂がないなど過年度と同様の出現傾向を示していた。

表 4-11 目視調査結果概要（植物） 泉大津沖埋立処分場

D-2	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
	調査日	基質	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	ブロック	転石	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫転石	巨礫	泥	
主要種※	平成22年5月21日	-	-	ワカメ フダラク オオバツノマタ	ワカメ ムカデノリ ツルツル	ワカメ ムカデノリ オオバツノマタ	ワカメ オオバツノマタ ベニスナゴ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	ワカメ ベニスナゴ カバノリ タオヤギソウ	ワカメ オオバツノマタ ベニスナゴ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	ススカケベニ カバノリ イトグサ属	-	-	-	-	-
	平成26年6月2日	-	シオグサ属	ワカメ フダラク	アオサ属 ワカメ ムカデノリ カバノリ	ワカメ ムカデノリ カバノリ	ワカメ カバノリ タオヤギソウ	ワカメ カバノリ タオヤギソウ	カバノリ	カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	ススカケベニ カバノリ イトグサ属	イトグサ属	-	-	-	-	-
	平成28年6月4日	-	ワカメ フダラク	アオサ属 フダラク ツルツル	アオサ属 ワカメ	ワカメ	ワカメ カバノリ	ワカメ	カバノリ タオヤギソウ	ワカメ	カバノリ タオヤギソウ	マウサ カバノリ タオヤギソウ	-	-	-	-	-	-
	平成30年5月26日	-	-	アオサ属 ワカメ	ワカメ	ワカメ ムカデノリ カバノリ	ワカメ カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	カバノリ タオヤギソウ	タオヤギソウ	-	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月21日	0	4	9	7	9	8	6	7	4	3	0	0	0	0	0	0	
	平成26年6月2日	0	4	7	7	8	6	4	4	5	4	2	3	2	1	0	0	
	平成28年6月4日	0	2	8	8	8	2	6	7	5	3	2	2	2	0	0	0	
	平成30年5月26日	0	4	10	7	8	5	4	7	4	4	3	2	2	0	0	0	

D-3	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
	調査日	基質	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	ケーツ	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥	
主要種※	平成22年5月21日	-	-	ワカメ	-	-	-	-	-	-	イギス科 ベニスナゴ	イギス科 ススカケベニ	イギス科	-	-	-	-	
	平成26年6月2日	-	-	-	ワカメ	タオヤギソウ	タオヤギソウ	タオヤギソウ	-	-	ススカケベニ カバノリ タオヤギソウ イトグサ属	ススカケベニ イトグサ属	ススカケベニ イトグサ属	イトグサ属	イトグサ属	-	-	
	平成28年6月4日	-	-	ワカメ	ワカメ	ワカメ ススカケベニ	ワカメ ススカケベニ タオヤギソウ	ワカメ ススカケベニ タオヤギソウ	ススカケベニ	ススカケベニ タオヤギソウ	ススカケベニ	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年5月26日	-	-	-	ワカメ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
種類数	平成22年5月21日	0	2	3	1	2	0	0	0	0	5	4	3	1	0	0	0	
	平成26年6月2日	0	3	1	1	3	2	2	2	2	4	4	2	2	1	1	0	
	平成28年6月4日	0	0	3	6	2	4	3	3	3	4	3	2	2	1	1	0	
	平成30年5月26日	0	0	4	7	6	6	5	4	5	4	2	2	2	1	1	0	

D-5	エコ岸壁									
	平均水面 (m)		壁面					遊水室		
	調査日	基質	+1	±0	-1	-2	-3	上面	側面	下面
主要種※	平成26年6月2日	垂藻綱	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成28年6月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成30年5月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
種類数	平成26年6月2日	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	平成28年6月4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平成30年5月26日	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-6	エコ岸壁													
	平均水面 (m)		壁面					遊水室						
	調査日	基質	+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	上室		下室		
主要種※	平成22年5月21日	アオノリ属 アオサ属	アオノリ属 アオサ属	アオサ属 ワカメ	アオサ属 ワカメ	ワカメ	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成26年6月2日	-	アオサ属	ツルツル	-	ワカメ タオヤギソウ	ワカメ タオヤギソウ	ススカケベニ	-	-	-	-	-	-
	平成28年6月4日	-	ワカメ フダラク	ムカデノリ	-	ワカメ タオヤギソウ	ススカケベニ タオヤギソウ	ススカケベニ タオヤギソウ	-	-	-	-	-	-
	平成30年5月26日	-	-	ワカメ ムカデノリ	-	タオヤギソウ	タオヤギソウ	ススカケベニ タオヤギソウ	-	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月21日	2	6	5	6	6	6	2	0	0	1	0	0	3
	平成26年6月2日	0	1	4	4	7	3	2	0	0	2	0	0	3
	平成28年6月4日	0	7	5	8	5	2	2	0	0	3	0	2	6
	平成30年5月26日	0	5	7	9	6	4	3	0	0	3	0	1	5

※主要種：観察時の出現被度が10%以上の種を抽出

[動物]

表 4-12 に泉大津沖埋立処分場における目視調査結果（動物）の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

D-2 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m で、主に潮間帯上部から飛沫帯に生息する巻貝のアラレタマキビ（移動性）が多くみられた。平均水面付近では巻貝類のイボニシ（移動性）、二枚貝類のムラサキイガイ（固着性）、イワフジツボ（固着性）が、平均水面以深では環形動物のカンザシゴカイ科（固着性）、苔虫綱（固着性）、キヒトデ（移動性）が多く出現した。今回の調査もアラレタマキビ、イボニシ、イワフジツボ、苔虫綱、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の出現傾向を示していた。

D-3 の地点のこれまでの調査では、平均水面+1m でアラレタマキビが多くみられた。平均水面付近では巻貝類のコモレビコガモガイ（移動性）、イボニシ、カラマツガイ（移動性）、ムラサキイガイなどが、平均水面以深では尋常海綿綱（固着性）、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、イトマキヒトデ（移動性）、キヒトデなどが多く出現した。今回の調査でも、コモレビコガモガイ、アラレタマキビ、イボニシ、カラマツガイ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

D-5 の地点のこれまでの調査では、壁面の平均水面+1m でアラレタマキビが多くみられた。壁面の平均水面付近ではイボニシ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科などが、平均水面以深では巻貝類のレイシガイ（移動性）、カンザシゴカイ科、苔虫綱が多くみられた。遊水室内ではレイシガイ、苔虫綱、イトマキヒトデ、キヒトデなどが多く生息していた。今回の調査でも、壁面でアラレタマキビ、レイシガイ、イボニシ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱が、遊水室内でレイシガイ、苔虫綱、イトマキヒトデ、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の生息状況を示していた。

D-6 の地点のこれまでの調査では、壁面の平均水面+1m でアラレタマキビやイワフジツボが多くみられた。壁面の平均水面付近ではイボニシ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科などが、平均水面以深ではムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、イトマキヒトデ、キヒトデなどが多く生息していた。遊水室の上室、下室内では巻貝類のシマメノウフネガイ（移動性）、レイシガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、イトマキヒトデ、キヒトデ、マナマコ（移動性）などが多く生息していた。今回の調査でも、壁面でアラレタマキビ、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、イワフジツボ、苔虫綱が、遊水室内でレイシガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱、キヒトデなどが主要種となり、これまでの調査と同様の分布傾向を示していた。

表 4-12 (1) 目視調査結果概要 (動物) 泉大津沖埋立処分場

D-2	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	調査日	基質	ア' ロック	ブ' ロック	ブ' ロック	ブ' ロック	ブ' ロック	ブ' ロック	ブ' ロック	乾石	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	泥
主要種※	平成22年5月21日	アラレタマキビ カラマツガイ	レイシガイ イボニシ カラマツガイ ムラサキガイ イワフジツボ	ムササキガイ カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科	菅虫綱 ホヤ綱(群体性)	菅虫綱	-	イトマキヒトデ	アミコケムシ科	アミコケムシ科	アミコケムシ科 キヒトデ	アミコケムシ科	アミコケムシ科	-
	平成26年6月2日	アラレタマキビ	ヨメガカサ イボニシ ムラサキガイ	イボニシ ムラサキガイ	カンザシゴカイ科	菅虫綱	コシダカガシラ カンザシゴカイ科 菅虫綱	菅虫綱	シマノウツネガイ	-	アミコケムシ科	アミコケムシ科	アミコケムシ科 キヒトデ	アミコケムシ科 キヒトデ	アミコケムシ科	アミコケムシ科	-
	平成28年6月4日	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ ウノアシ イボニシ イワフジツボ	-	尋常海綿綱 ヒドロ虫綱	Phoronis属 菅虫綱	カンザシゴカイ科	カンザシゴカイ科 菅虫綱	コシダカガシラ サンショウウニ	コシダカガシラ	-	サンショウウニ	サンショウウニ	サンショウウニ	サンショウウニ	-	-
	平成30年5月26日	アラレタマキビ	ヨメガカサ コモレビコガモガイ ウノアシ イボニシ カラマツガイ イワフジツボ	イボニシ	ヒドロ虫綱 菅虫綱	尋常海綿綱 カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱	菅虫綱 イトマキヒトデ	-	-	キヒトデ	-	-	-	-	-
種類数	平成22年5月21日	5	5	3	3	3	6	3	4	4	4	3	4	3	2	1	
	平成26年6月2日	2	4	8	6	7	9	7	10	6	5	6	8	7	4	0	
	平成28年6月4日	3	9	9	7	9	7	7	8	7	6	6	6	5	2	0	
	平成30年5月26日	2	13	9	7	8	7	10	9	4	6	6	7	5	0	0	

D-3	平均水面 (m)		+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	調査日	基質	ケーソン	ケーソン	ケーソン	ケーソン	ケーソン	ケーソン	ケーソン	ケーソン	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	巨礫	砂泥
主要種※	平成22年5月21日	アラレタマキビ イワフジツボ	ムラサキガイ	ムラサキガイ	レイシガイ ムラサキガイ カンザシゴカイ科 アミコケムシ科 キヒトデ ホヤ綱(群体性)	カンザシゴカイ科 菅虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱 泥炭	菅虫綱 イトマキヒトデ 泥炭	-	アミコケムシ科 キヒトデ	アミコケムシ科	アミコケムシ科	アミコケムシ科	アミコケムシ科	-	-
	平成26年6月2日	アラレタマキビ	クサシロコガモガイ コモレビコガモガイ イボニシ カラマツガイ キムラサキガイ ムラサキガイ イワフジツボ	イボニシ ムラサキガイ	海綿動物門 レイシガイ ムラサキガイ カンザシゴカイ科 キヒトデ	フサコケムシ科 菅虫綱	フサコケムシ科 菅虫綱 ホヤ綱(群体性)	カンザシゴカイ科 菅虫綱	イボニシ 菅虫綱 キヒトデ	-	-	キヒトデ	アミコケムシ科	アミコケムシ科	アミコケムシ科	-	
	平成28年6月4日	アラレタマキビ	コモレビコガモガイ アラレタマキビ イボニシ カラマツガイ ムラサキガイ	尋常海綿綱 ムラサキガイ	尋常海綿綱 ムラサキガイ	Phoronis属 菅虫綱 レイシガイ ムラサキガイ	カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱 イトマキヒトデ	カンザシゴカイ科 菅虫綱	サンショウウニ	サンショウウニ	シマノウツネガイ サンショウウニ	サンショウウニ	菅虫綱 サンショウウニ	-	-	
	平成30年5月26日	アラレタマキビ	ヨメガカサ アラレタマキビ イボニシ カラマツガイ イワフジツボ	ウノアシ ムラサキガイ	レイシガイ ムラサキガイ カンザシゴカイ科	レイシガイ ムラサキガイ 菅虫綱 キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱	カンザシゴカイ科 菅虫綱	キヒトデ	-	キヒトデ	菅虫綱	-	菅虫綱	-	
種類数	平成22年5月21日	2	4	4	11	7	8	7	8	5	3	4	3	3	1	0	
	平成26年6月2日	2	7	7	12	11	12	9	14	5	5	6	6	6	7	0	
	平成28年6月4日	1	8	3	8	11	9	7	10	6	5	6	4	4	3	0	
	平成30年5月26日	1	9	5	8	11	9	5	6	4	5	6	6	3	4	0	

※主要種：観察時の個体数が3個体以上または出現被度が10%以上の種を抽出

表 4-12 (2) 目視調査結果概要 (動物) 泉大津沖埋立処分場

D-5		エコ岸壁								
		壁面					遊水室			
調査日	平均水面 (m) 基質	+1	±0	-1	-2	-3	遊水室			
		ケ-ソソ	石網	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	上面	側面	下面	
主要種※	平成26年6月2日	アラレタマキビ	イボニシ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	レイシガイ イボニシ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	シマメノウツネガイ レイシガイ カンザシゴカイ科 アミコケムシ科 苔虫綱	苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ ムラサキイガイ イトマキヒトデ キヒトデ マナマコ	
	平成28年6月4日	アラレタマキビ	イボニシ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱	苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ マナマコ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ マナマコ	レイシガイ イトマキヒトデ キヒトデ サンショウウニ マナマコ	
	平成30年5月26日	アラレタマキビ	イボニシ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 Phoronis属 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ サンショウウニ	レイシガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ イトマキヒトデ キヒトデ サンショウウニ	
種類数	平成26年6月2日	1	5	9	11	11	10	8	11	
	平成28年6月4日	1	3	8	9	9	10	8	10	
	平成30年5月26日	1	3	12	10	9	11	11	10	

D-6		エコ岸壁													
		壁面							遊水室						
調査日	平均水面 (m) 基質	+1	±0	-1	-2	-3	-4	-5	上室			下室			
		ケ-ソソ	石網	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	ケ-ソソ	上面	側面	下面	上面	側面	下面	
主要種※	平成22年5月21日	イワフジツボ	レイシガイ イボニシ ムラサキイガイ マダギ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 キヒトデ ユウレイボヤ属	カンザシゴカイ科 キヒトデ ユウレイボヤ属	キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ ユウレイボヤ属	カンザシゴカイ科	キヒトデ
	平成26年6月2日	アラレタマキビ イワフジツボ	イボニシ カンザシゴカイ科	ムラサキイガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	シマメノウツネガイ レイシガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ マナマコ	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	レイシガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ	シマメノウツネガイ レイシガイ 苔虫綱 イトマキヒトデ マナマコ	
	平成28年6月4日	アラレタマキビ イワフジツボ	ムラサキイガイ	ムラサキイガイ 苔虫綱 キヒトデ	カンザシゴカイ科 苔虫綱	サンカクフジツボ 苔虫綱 サンショウウニ ホヤ綱(単体性)	カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	カンザシゴカイ科 ホヤ綱(単体性)	-	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	レイシガイ 苔虫綱	レイシガイ ムラサキイガイ ヤドリ上科 苔虫綱 イトマキヒトデ キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ	レイシガイ ウミフクロウ カンザシゴカイ科 苔虫綱 イトマキヒトデ サンショウウニ	レイシガイ イトマキヒトデ キヒトデ マナマコ
	平成30年5月26日	アラレタマキビ イワフジツボ	ムラサキイガイ	イソギンチャク目 ムラサキイガイ ヨ-ロハフジツボ 苔虫綱	カンザシゴカイ科 苔虫綱	カンザシゴカイ科 ホヤ綱(単体性)	カンザシゴカイ科 ホヤ綱(単体性)	-	イソギンチャク目 レイシガイ ムラサキイガイ カンザシゴカイ科 苔虫綱 キヒトデ ホヤ綱(単体性)	イソギンチャク目 レイシガイ ムラサキイガイ Phoronis属 苔虫綱 キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 キヒトデ	レイシガイ カンザシゴカイ科 キヒトデ	レイシガイ 苔虫綱 キヒトデ	レイシガイ 苔虫綱 キヒトデ	レイシガイ キヒトデ
種類数	平成22年5月21日	2	13	12	10	8	8	5	7	6	4	6	3	2	
	平成26年6月2日	2	4	7	7	10	8	10	11	11	13	10	10	14	
	平成28年6月4日	3	5	8	9	5	8	8	9	12	12	8	11	16	
	平成30年5月26日	3	5	9	11	6	7	7	10	12	6	9	7	5	

※主要種：観察時の個体数が3個体以上または出現被度が10%以上の種を抽出

4-2 遊泳魚類等の状況

表 4-13 に各処分場における遊泳魚類等の目視観察結果の概要をこれまでの調査結果とあわせて示した。

(1) 神戸沖埋立処分場

今回の調査では、遊泳魚類等としてメバル、カサゴ、アイナメ、クロダイ、メジナ、イシダイ、スズメダイ、コブダイ、キュウセン、ウマヅラハギ、コウイカの計 11 種が目視確認された。海藻の被度が高い場所で多くみられる傾向があった。

これら確認された魚類等のほとんどは、確認された護岸周辺で定住している種であり、藻場やブロックがこれら魚類等の良好な生息環境となっていると考えられる。

なお、過年度の結果と比較すると、種類数については、平成 22 年度以降、同程度からやや増加傾向にあり、個体数については、平成 26 年度調査時に最大であり、その他の年度では同程度で推移していると思われる。

(2) 大阪沖埋立処分場

今回の調査では遊泳魚類としてメバル、カサゴ、アイナメ、クロダイ、メジナ、イシダイ、ウミタナゴ、スズメダイ、コブダイ、ホシササノハベラ、キュウセン、ウマヅラハギ、ヒガンフグ、コモnfフグの計 14 種が目視確認された。海藻の被度が高い場所で多くみられる傾向があった。

これら確認された魚類のほとんどは、確認された護岸周辺で定住している種であり、藻場やブロック、石積みの間隙などの空間がこれら魚類の良好な生息環境となっていると考えられる。

なお、これまでの調査と比較すると、種類数については、平成 22 年度は 2 種と少なかったが、平成 24 年度以降は 8~14 種であり、今年度は過去最大となった。個体数については、平成 26 年度以降、増加していると考えられる。

(3) 泉大津沖埋立処分場

今回の調査では遊泳魚類としてメバル、カサゴ、アイナメ、アナハゼ、クロダイ、ウミタナゴ、スズメダイ、ボラ、ボラ科、ホシササノハベラ、キュウセン、ドロメ、ウマヅラハギの計 13 種が確認された。海藻の被度が高い場所で多くみられる傾向があった。

これら確認された魚類のほとんどは（ボラは回遊）、確認された護岸周辺で定住している種であり、藻場やブロック、石積みの間隙などの空間がこれら魚類の良好な生息環境となっており、ボラなど回遊魚にとっても餌場などとして利用されているものと考えられる。

なお、過年度の結果と比較すると、種類数については、平成 28 年度に 17 種類で最大となっているが、今年度調査も含めた他の年度では同程度で推移している。個体数については、平成 22 年度調査および今回の調査では、cc:51 個体以上の出現頻度が高くなっているが、全調査期間を通じて多数の魚類の生息状況がうかがわれる。

表 4-13 遊泳魚類等目視観察結果の概要

場所		神戸沖					大阪沖				
調査年度		H22	H24	H26	H28	H30	H22	H24	H26	H28	H30
個体数 概要	c (11~50個体) の出現頻度	0	2	4	1	1	1	3	6	8	7
	cc (51個体以上) の出現頻度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出現種類数		7	8	10	11	11	2	8	11	8	14

場所		泉大津沖			
調査年度		H22	H26	H28	H30
個体数 概要	c (11~50個体) の出現頻度	4	6	7	2
	cc (51個体以上) の出現頻度	4	1	1	3
出現種類数		11	12	17	13

注 1) 個体数概要においては、各魚種ごとの観察水深帯別の c:11~50 個体または cc:51 個体以上の出現頻度を集計したものであり、神戸沖埋立処分場 3 地点 (A-2、A-4、A-5)、大阪沖埋立処分場 3 地点 (C-1、C-2、C-3)、泉大津沖埋立処分場 4 地点 (D-2、D-3、D-5、D-6) の合計である。

注 2) 個体数の少ない rr:1~2 個体、r:3~10 個体については種類数には集計しているが、個体数の集計は割愛した。

4-3 水質等の状況

(1) 神戸沖埋立処分場

表 4-14 に神戸沖埋立処分場における水質等の調査結果の概要をこれまでの調査結果と合わせて示した。

各地点において透明度、水温、塩分、溶存酸素（DO）に大きな傾向の違いはみられず、海生生物の生息に際して影響のある状況は確認されていない。

相対光量が 1%以下になる水深は 10～13m であり、概ね海藻類の生育水深帯と一致していた。

過年度調査と比較すると、今回の調査では A-2 と A-4 で DO の最低値が低くなっていたが、海藻の生育する水深帯では、ほぼ 5mg/L 以上となっており、今年度も過年度同様に海生生物に与える影響は少ないと考えられる。その他の項目については大きな傾向の違いはみられなかった。

表 4-14 水質等調査結果の概要（神戸沖埋立処分場）

海域	地点	調査年度	透明度(m)	水温(°C)	塩分(-)	DO (mg/L)	相対光量 (%)
神戸沖	A-2	平成22年5月30日	3.0	15.7 ~ 17.6	27.1 ~ 32.1	4.6 ~ 10.6	0.1 ~ 62.5
		平成24年5月26日	4.1	15.4 ~ 19.4	25.8 ~ 32.2	3.4 ~ 10.7	0.1 ~ 29.8
		平成26年6月1日	1.8	16.0 ~ 22.0	24.1 ~ 32.2	3.8 ~ 11.7	0.0 ~ 100.0
		平成28年5月28日	2.3	16.6 ~ 21.0	23.1 ~ 32.0	2.6 ~ 11.3	0.2 ~ 100.0
		平成30年6月2日	3.7	15.6 ~ 20.5	23.4 ~ 32.3	1.5 ~ 12.0	0.3 ~ 100.0
	A-4	平成22年5月30日	2.8	15.8 ~ 17.3	27.6 ~ 32.1	4.7 ~ 11.2	0.1 ~ 73.3
		平成24年5月26日	3.8	15.6 ~ 19.0	25.5 ~ 32.1	3.6 ~ 10.3	0.1 ~ 31.8
		平成26年6月1日	3.0	16.5 ~ 24.5	25.5 ~ 32.2	4.3 ~ 11.6	0.0 ~ 100.0
		平成28年5月28日	2.2	16.8 ~ 20.9	22.8 ~ 32.0	2.9 ~ 10.5	0.3 ~ 100.0
		平成30年6月2日	3.8	16.1 ~ 20.7	21.7 ~ 32.4	2.5 ~ 8.0	0.0 ~ 100.0
	A-5	平成22年5月30日	2.3	16.1 ~ 16.8	29.1 ~ 31.8	5.5 ~ 10.3	0.1 ~ 59.8
		平成24年5月26日	3.5	15.7 ~ 18.2	23.4 ~ 32.1	5.1 ~ 9.6	0.1 ~ 73.5
		平成26年6月1日	5.5	16.8 ~ 21.5	29.4 ~ 32.2	4.7 ~ 9.2	0.0 ~ 100.0
		平成28年5月28日	2.9	17.1 ~ 20.1	27.7 ~ 32.0	3.3 ~ 8.8	0.3 ~ 100.0
		平成30年6月2日	3.8	16.8 ~ 18.9	27.3 ~ 32.4	3.9 ~ 7.9	0.1 ~ 100.0

(2) 大阪沖埋立処分場

表 4-15 に大阪沖埋立処分場における水質等の調査結果の概要をこれまでの調査結果と合わせて示した。

各地点において透明度、水温、塩分、溶存酸素（DO）に大きな傾向の違いはみられず、海生生物の生息に際して影響のある状況は確認されなかった。

過年度調査と比較すると、今回の調査では C-1 と C-2 で DO の最低値が低くなっていたが、海藻の生育する水深帯ではほぼ 5mg/L 以上となっており、今年度も過年度同様に海生生物に与える影響は少ないと考えられる。その他の項目については大きな傾向の違いはみられなかった。

表 4-15 水質等調査結果の概要（大阪沖埋立処分場）

海域	地点	調査年度	透明度(m)	水温(°C)	塩分(-)	DO (mg/L)	相対光量 (%)
大阪沖	C-1	平成22年5月29日	3.6	15.8 ~ 16.5	27.2 ~ 32.1	4.8 ~ 7.2	0.3 ~ 72.1
		平成24年6月3日	2.8	16.5 ~ 20.4	24.3 ~ 32.2	5.5 ~ 13.5	0.1 ~ 40.6
		平成26年5月31日	2.3	16.3 ~ 23.2	26.2 ~ 32.2	3.9 ~ 11.6	0.0 ~ 100.0
		平成28年5月29日	4.8	17.1 ~ 20.1	26.5 ~ 32.1	3.5 ~ 8.8	0.6 ~ 100.0
		平成30年6月3日	2.5	16.3 ~ 20.3	24.5 ~ 32.5	2.9 ~ 9.5	1.2 ~ 100.0
	C-2	平成22年5月29日	3.3	16.2 ~ 16.6	28.5 ~ 32.0	5.6 ~ 8.0	0.4 ~ 66.5
		平成24年6月3日	2.8	16.5 ~ 19.4	17.3 ~ 32.4	5.2 ~ 10.9	0.1 ~ 61.7
		平成26年5月31日	2.5	16.5 ~ 24.5	26.5 ~ 32.0	5.0 ~ 12.4	0.2 ~ 100.0
		平成28年5月29日	6.2	18.1 ~ 20.5	22.6 ~ 32.1	5.7 ~ 8.1	4.5 ~ 100.0
		平成30年6月3日	4.8	16.6 ~ 20.7	25.9 ~ 32.5	3.8 ~ 8.8	1.5 ~ 100.0
	C-3	平成22年5月29日	5.3	16.0 ~ 19.0	22.4 ~ 32.1	5.3 ~ 8.6	0.1 ~ 59.9
		平成24年6月3日	5.5	16.7 ~ 18.7	30.1 ~ 32.2	6.4 ~ 9.1	0.5 ~ 67.2
		平成26年5月31日	2.5	16.1 ~ 24.4	26.8 ~ 32.2	3.4 ~ 12.6	0.0 ~ 100.0
		平成28年5月29日	7.1	17.8 ~ 19.7	28.9 ~ 32.2	5.9 ~ 7.2	1.4 ~ 100.0
		平成30年6月3日	2.1	16.6 ~ 22.2	25.9 ~ 32.5	3.8 ~ 11.4	1.2 ~ 100.0

(3) 泉大津沖埋立処分場

表 4-16 に泉大津沖埋立処分場における水質等の調査結果の概要をこれまでの調査結果と合わせて示した。

各地点において透明度、水温、塩分、溶存酸素（DO）に地点間での大きな傾向の違いはみられず、海生生物の生息に際して影響のある状況は確認されなかった。相対光量が1%以下になる水深は8~9m以下であり、概ね海藻類の生育水深帯と一致していた。

過年度調査と比較すると、今回の調査ではD-5で塩分濃度の最低値が低くなっていること、同じくD-5でDOの最低値が低くなっていることが挙げられるが、塩分濃度については0mのみ低くなっていること、DOについてはエコ護岸の存在する水深では5mg/L以上となっていること等から、海生生物に与える影響は小さいと考えられる。その他の項目については大きな傾向の違いはみられなかった。

なお、平成22年度については、透明度が高く、水底近くの相対光量も高くなっている。

表 4-16 水質等調査結果の概要（泉大津沖埋立処分場）

海域	地点	調査年度	透明度(m)	水温(°C)	塩分(-)	DO (mg/L)	相対光量 (%)
泉大津沖	D-2	平成22年5月21日	7.5	14.7 ~ 19.6	29.4 ~ 32.0	3.8 ~ 9.9	1.5 ~ 62.4
		平成26年6月2日	2.8	16.6 ~ 24.3	29.0 ~ 32.1	3.2 ~ 12.5	0.4 ~ 100.0
		平成28年6月4日	2.2	17.8 ~ 19.9	30.9 ~ 32.1	2.9 ~ 13.1	0.2 ~ 100.0
		平成30年5月26日	4.0	15.6 ~ 21.1	28.5 ~ 32.1	2.9 ~ 10.9	2.4 ~ 100.0
	D-5	平成26年6月2日	2.8	16.6 ~ 24.3	29.0 ~ 32.1	3.2 ~ 12.5	0.4 ~ 100.0
		平成28年6月4日	2.3	17.0 ~ 20.1	30.6 ~ 32.1	3.0 ~ 11.2	0.2 ~ 100.0
		平成30年5月26日	3.1	15.6 ~ 21.2	22.8 ~ 32.0	2.2 ~ 8.8	1.4 ~ 100.0
	D-6	平成22年5月21日	7.3	14.6 ~ 22.0	24.4 ~ 32.0	2.8 ~ 10.3	1.4 ~ 56.9
		平成26年6月2日	2.8	16.6 ~ 24.3	29.0 ~ 32.1	3.2 ~ 12.5	0.4 ~ 100.0
		平成28年6月4日	3.0	17.8 ~ 20.2	27.2 ~ 32.1	2.8 ~ 9.7	0.7 ~ 100.0
		平成30年5月26日	3.5	16.0 ~ 20.4	29.1 ~ 31.9	4.8 ~ 8.5	3.5 ~ 100.0

4-4 藻場分布の状況

(1) 神戸沖埋立処分場

付着動植物調査、代表地点（6点）における採取・目視調査、護岸全体の目視調査によって、一年生海藻類のワカメ、シダモク、アカモク、タマハハキモクおよび多年生のヨレモクモドキからなる藻場の分布が確認された。

表 4-17 に確認された藻場構成種および藻場構成種以外の主要海藻ごとに過年度調査からの変化状況について整理した。なお、護岸配置の状況は図 4-1 のとおりである。

前回と比較してワカメ、シダモク、タマハハキモクは藻場が増大する傾向がみられた。ヨレモクモドキは前回と同程度の生育状況であった。アカモクについては、今回初めて確認された。

その他主要海藻については、緑藻のアオサ属で分布域および被度の縮小傾向が、ベニスナゴ、カバノリ、ツルツルなどの紅藻で分布域および被度の増大の傾向がみられた。

表 4-17 確認された藻場構成種等の分布状況の変化 神戸沖埋立処分場

区分	種類	分布域の変化	被度の変化 (生育密度)	備考
藻場 構成種	ワカメ	前回より増加	前回より増加	分布域は各護岸とも増加、西護岸では初確認 被度 51%以上の濃密域が出現
	カジメ	今回未確認	今回未確認	H21 年のみ南護岸の 1 箇所を確認
	シダモク	前回より増加	前回より増加	分布域は西護岸、東護岸で増加 被度 51%以上の濃密域が出現
	アカモク	今回初確認	今回初確認	西護岸の 1 箇所を確認
	タマハハキモク	前回より増加	前回よりやや増加	西護岸で再確認、南護岸でやや減少 被度 51%以上の濃密域が出現
	ヒジキ	今回未確認	今回未確認	H21 年のみ西護岸の 1 箇所を確認
	ヨレモクモドキ	前回と同程度	前回と同程度	南護岸では未確認
その他 主要海藻	アオサ属	前回よりやや減少	前回より減少	分布域は西護岸、南護岸で減少 各護岸で被度は減少
	マクサ	前回よりやや増加	前回よりやや減少	分布域は西護岸で増加、南護岸で減少
	ススカケベニ	前回と同程度	前回と同程度	東護岸では未確認
	フダラク	前回よりやや増加	前回と同程度	分布域は東護岸で増加、西護岸では未確認
	ベニスナゴ	前回より増加	前回より増加	各護岸の広い範囲で確認、被度も増加
	カバノリ	前回より増加	前回より増加	分布域は西護岸、東護岸で増加
	ツルツル	前回より増加	前回より増加	各護岸で再確認、前回未確認

※：カジメ、ヨレモクモドキは多年生の藻場構成種（他は 1 年生）

図 4-1 神戸沖埋立処分場 護岸配置

(2) 大阪沖埋立処分場

付着動植物調査、代表地点（6点）における採取・目視調査、護岸全体の目視調査によって、一年生海藻類のワカメ、シダモク、タマハハキモクからなる藻場の分布が確認された。

表 4-18 に確認された藻場構成種および藻場構成種以外の主要海藻ごとに過年度調査からの変化状況について整理した。なお、護岸配置の状況は図 4-2 のとおりである。

前回と比較してワカメについては分布域および被度の増大が認められ、シダモク、タマハハキモクについては前回同様の藻場の形成状況が確認された。前回確認されたアカモクについては今回、確認できなかった。

その他主要海藻については、紅藻のカバノリ、マクサで分布域および被度の増大が紅藻のツルツルで分布域および被度の縮小の傾向がみられた。

表 4-18 確認された藻場構成種等の分布状況の変化 大阪沖埋立処分場

区 分	種 類	分布域の変化	被度の変化 (生育密度)	備 考
藻場 構成種	ワカメ	増加傾向	増加傾向	分布域、被度ともに各護岸で増加
	カジメ	今回未確認	今回未確認	H22、H24 にわずかに確認
	シダモク	前回と同程度	前回と同程度	分布域は北護岸で増加、南護岸で減少
	アカモク	前回より減少	前回より減少	今回未確認
	タマハハキモク	前回と同程度	前回と同程度	H28 と同程度
	ヨレモクモドキ	今回未確認	今回未確認	H22 に 1 箇所でのみ確認
その他 主要海藻	アオサ属	前回と同程度	前回よりやや減少	分布域は H28 と同程度
	ススカケベニ	前回より減少	前回と同程度	分布域は北護岸、西護岸で減少
	フダラク	前回より増加	前回と同程度	分布域は各護岸で増加
	ベニスナゴ	前回と同程度	前回よりやや減少	分布は北護岸で増加、南護岸で減少
	カバノリ	前回より増加	前回より増加	分布域、被度ともに各護岸で増加
	マクサ	前回より増加	前回より増加	南護岸で確認、前回は未確認
	ツルツル	前回より減少	前回より減少	分布域は北護岸で増加、西護岸、南護岸で減少

※：カジメ、ヨレモクモドキは多年生の藻場構成種（他は 1 年生）

図 4-2 大阪沖埋立処分場 護岸配置

4-5 まとめ(要約)

フェニックス埋立処分場護岸における海生生物の分布状況を把握するとともに、緩傾斜護岸が有する「海生生物の生息環境の保全・創造効果」を確認することを目的として、神戸沖埋立処分場・大阪沖埋立処分場において、坪刈りと目視による付着動植物調査、遊泳魚類等調査、水質調査、藻場分布調査を平成 30 年春季に実施した。

(1) 神戸沖埋立処分場

神戸沖埋立処分場護岸では、付着植物(海藻)として緩傾斜護岸の平均水面付近では緑藻のアオサ属が多くみられた。藻場構成種となる大型褐藻では-2~-3m 付近の緩傾斜護岸でワカメとシダモクが、傾斜護岸の-1~-5m 付近でワカメが確認された。この他、各護岸の-2m 以深では紅藻のイギス目が連続的に生育していた。

付着動物は平均水面より上部では移動性の貝類であるアラレタマキビが多く確認された。平均水面付近では固着性の二枚貝であるムラサキイガイや固着性のイワフジツボなどが多くみられた。-1~-3m では、ムラサキイガイや固着性のカンザシゴカイ科が多くみられた。-1m 以深では移動性のイトマキヒトデ、キヒトデ、マナマコなどが多くみられた。

魚類ではメバル、カサゴ、アイナメ、クロダイ、メジナ、スズメダイ、キュウセンなどの定住性の魚類が各護岸の-2~-11m 付近で確認された。

水質として、溶存酸素は各護岸の水深帯4~13m 以浅では何れも5mg/L 以上であり、5mg/L 以下の水深帯でも生物の生息・生育は確認された。海藻類の生育制限因子となる光量については、護岸の設置されている10m 以浅の水深帯では相対光量がほぼ1.0%以上となっていた。以上から、処分場周辺の水質は動植物の生息・生育環境として問題のない状況であると言える。

藻場分布調査では、大型褐藻として一年生のワカメ、シダモク、アカモク、タマハハキモク、多年生のヨレモクモドキの分布が確認された。中でもワカメ、シダモク、タマハハキモクが各護岸で広範囲に確認された。多年生のヨレモクモドキは西護岸と東護岸で小規模に生育しており、アカモクは今年度が初確認であった。

前回平成 28 年度調査と比較すると、ワカメ、シダモク、タマハハキモクの分布域の拡大、被度の増加など藻場の増大が確認され、特に直立護岸である西護岸での増大が顕著であった。平成 28 年度には藻場の縮小がうかがわれており、今後の継続調査でこうした状況の推移を確認していく必要がある。

(2) 大阪沖埋立処分場

大阪沖埋立処分場護岸では、付着植物（海藻）として、藻場構成種となる大型褐藻類では、各護岸の-1～-5m でワカメ、シダモク、タマハハキモクが確認された。この他、-1～-3m 付近の緩傾斜および傾斜護岸ではフダラク、ツルツルなどの紅藻類が多く、-5m 以深の各護岸ではサンゴモ科、イワノカワ科、ベニスナゴなどの紅藻類が多くみられた。

付着動物は各護岸の平均水面より上部では移動性の巻貝であるアラレタマキビが多くみられた。平均水面付近では固着性二枚貝のムラサキイガイ、イタボガキ科、移動性の巻貝であるコモレビコガモガイ、カラマツガイなどが多く生息していた。-1～-3m のケーソンや護岸ブロック表面ではムラサキイガイや固着性のカンザシゴカイ科などの被度が高かった。-4m 以深では固着性の苔虫綱や移動性のキヒトデが多くみられた。

魚類ではメバル、クロダイ、メジナ、ウミタナゴ、スズメダイなどの定住性の魚類が各護岸の-2～-9m 付近で多く確認された。

水質として、溶存酸素は各護岸の水深帯5～11m 以浅では何れも5mg/L 以上であり、5mg/L 以下の水深帯でも生物の生息・生育は確認された。海藻類の生育制限因子となる光量については、護岸の設置されている10m 以浅の水深帯では相対光量が1.0% 以上となっていた。以上から、処分場周辺の水質は動植物の生息・生育環境として問題のない状況であると言える。

藻場分布調査では、大型褐藻として一年生のワカメ、シダモク、タマハハキモクの分布が確認された。ワカメ、シダモク、タマハハキモクが各護岸で広範囲に確認され、前回調査と比較して、ワカメについては分布域、被度の増加傾向がみられた。また、今回調査では前回確認されたアカモクは確認されていない。

大阪沖埋立処分場は、平成21年7月の護岸概成以降9年近くが経過した。藻場の増大、遊泳魚類等の個体数の増加傾向が認められ、海域環境、生物の生息基盤としての護岸環境の安定化が進んでいると考えられる。本調査を通じて、今後の推移を確認しておく必要がある。

(3) 泉大津沖埋立処分場

泉大津沖埋立処分場護岸では、付着植物（海藻）として、藻場構成種となる大型褐藻では-1～-5m でワカメが多く確認された。この他、傾斜護岸の-1m 付近では緑藻のアオサ属が、-3m 以深ではムカデノリ、カバノリ、タオヤギソウなどの紅藻が多くみられ、エコ岸壁のケーソン部分の-3～-5m ではタオヤギソウが繁茂していた。

付着動物は各護岸の平均水面より上部では移動性の巻貝であるアラレタマキビが多く確認された他、固着性のイワフジツボも部分的に多かった。平均水面付近では固着性の二枚貝であるムラサキイガイ、移動性の巻貝であるヨメガカサ、コモレビコガモガイ、アラレタマキビ、イボニシなどが多く確認された。-1m 以深ののケーソンや護岸ブロック表面ではムラサキイガイ、固着性のカンザシゴカイ科、苔虫綱などが多くみられ、-2m 以深では、移動性のイトマキヒトデ、キヒトデなどが多くみられた。遊水室内では、固着性のイソギンチャク目、ムラサキイガイ、カンザシゴカイ科、苔虫綱や移動性の巻貝であるレイシガイ、移動性のイトマキヒトデ、キヒトデ、サンショウウニなどが多く生息していた。

魚類ではメバル、クロダイなどの定住性の魚類が各護岸の-2～-11m 付近及び遊水室内で多く確認された。その他、ボラ科やドロメの稚仔魚がエコ岸壁周辺で多数確認されており、これら魚類の生育場としてエコ岸壁が機能していると考えられる。

水質として、溶存酸素は各護岸が設置されている水深 7m 以浅では何れも 5mg/L 以上であり、海藻類の生育制限因子となる光量について、護岸の設置されている 12m 以浅の水深帯において相対光量が 1.0%以上となっていた。また、河川の影響等による塩分の低下した地点もみられたが、動植物の生息・生育環境として問題のない状況であった。